

السؤال الاول : اكتب المفاهيم العلمية

المفهوم	المصطلح العلمي (الباب الاول)
الجدول الدوري الحديث	جدول رتب فيه العناصر تصاعديا حسب الزيادة في اعدادها الذرية
العنصر الانتقالي	هو العنصر الذي تكون فيه الأوربيثالات (d^{1-9}) أو (f^{1-13}) مشغولة ولكنها غير تامة الامتلاء سواء في الحالة الذرية أو في أي حالة من حالات تأكسده
العناصر الانتقالية الرئيسية	هي عناصر يتتابع فيها امتلاء المستوي الفرعي (d) الذي يتسع لعشرة إلكترونات ويكون تركيبها الإلكتروني $ns^2 d^{1-10} (n-1)$
السلسلة الانتقالية الاولى	مجموعة من العناصر يتتابع فيها امتلاء المستوي الفرعي $3d$ تقع في الدورة الرابعة بعد الكالسيوم تبدأ بالسكانديوم وتنتهي بالخارصين
السلسلة الانتقالية الثانية	مجموعة من العناصر يتتابع فيها امتلاء المستوي الفرعي $4d$ تقع في الدورة الخامسة بعد الاسترانسيوم تبدأ بالتيريوم وتنتهي الكاديوم
السلسلة الانتقالية الثالثة	مجموعة من العناصر يتتابع فيها امتلاء المستوي الفرعي $5d$ تقع في الدورة السادسة بعد الباريوم تبدأ اللانثانيوم وتنتهي الزئبق
السلسلة الانتقالية الرابعة	مجموعة من العناصر يتتابع فيها امتلاء المستوي الفرعي $6d$ تقع في الدورة السابعة بعد الراديوم
الغاز المائي	خليط من الهيدروجين وغاز اول اكسيد الكربون يستخدم كوقود سائل
محلل فهلنج	العامل المختزل في الفرن مدرّكس يستخدم كوقود سائل وينتج من الميثان من مركبات النحاس يستخدم في الكشف عن سكر الحلو كوز حيث يتحول اللون الأزرق الى اللون البرتقالي
المواد البارامغناطيسية	المادة التي تتجذب للمجال المغناطيسي الخارجي نتيجة وجود إلكترونات مفردة اعداد : الدكتور محمد رزق
المواد الدايمغناطيسية	المادة التي تتنافر مع المجال المغناطيسي الخارجي نتيجة لوجود جميع الإلكترونات في حالة ازدواج
العزم المغناطيسي	هو عدد الإلكترونات المفردة في المستوي الفرعي ($3d$)
الحديد	عصب الصناعة الثقيلة ولا يوجد بشكل حر الا في النيازك (90 %) ويوجد في القشرة الارضية
عملية التكسير	عملية الهدف منها الحصول على الحجم المناسبة لعملية الاختزال
عملية التليد	عملية الغرض منها تجميع حبيبات الخام الناعمة في احجام اكبر تكون متماثلة ومتجانسة
عملية التركيز	عملية الغرض منها زيادة نسبة الحديد وذلك بفصل الشوائب والمواد الغير مرغوب فيها والتي تكون متحدة معها كيميائيا او مختلطة بها عن طريق التوتر السطحي والفصل المغناطيسي او الكهربائي
عملية التحميص	عملية الهدف منها تحسين الخواص الكيميائية للخام وتتم بتسخين الخام بشدة في الهواء
اول اكسيد الكربون	العامل المختزل في الفرن العالي وينتج من فحم الكوك

انتاج الحديد	هي عملية انتاج انواع مختلفة من الحديد مثل الحديد الزهر والحديد الصلب
السبائك	تتكون من خلط عدة عناصر للحصول على صفات جديدة مرغوبة
طريقة الصهر	مخلوط لمصهور فلزين أو أكثر، أو فلز وعدة عناصر لا فلزية بنسب وزنية معينة
طريقة الترسيب الكهربى	طريق صهر الفلزات مع بعضها وترك المنصهر ليبرد تدريجيا
سبيكة البينية	عن طريق الترسيب الكهربى لفلزين أو أكثر في نفس الوقت
سبيكة الاستبدال	اعداد : الدكتور محمد رزق
سبيكة البينفلزية	هي سبيكة تتكون عن ادخال ذرات فلز اقل حجما الى المسافات البينية للشبكة البلورية للفلز الاصلى اكبر حجما مما يعوق انزلاق الطبقات فيزداد صلابة الفلز
الهيماتيت	هي سبيكة يتم فيها استبدال ذرات الفلز الاصلى بذرات فلز اخر
الليمونيت	هي سبيكة يتم فيها اتحاد العناصر المكونة للسبيكة اتحادا كيميائيا فتكون مركبات كيميائية
السيديريت	أحد خامات الحديد لونه أحمر داكن ويسمى اكسيد حديد
المجنتيت	أحد خامات الحديد لونه أصفر ويسمى اكسيد حديد متهدرت
المفهوم	أحد خامات الحديد لونه رمادي مصفر ويسمى كربونات الحديد
التحليل الكيميائي	أكسيد مركب ينتج من تفاعل الحديد المسخن لدرجة الاحمرار مع الهواء أو بخار الماء الساخن ولونه اسود ويسمى باكسيد حديد مغناطيسي
تحليل المركبات العضوية	المصطلح العلمى (الباب الثانى)
تحليل المركبات الغير العضوية	أحد فروع علم الكيمياء يهدف الى التعرف على نوع و نسبة كل عنصر في المادة و كيفية ارتباط هذه العناصر مع بعضها للوصول الى الصيغة الجزيئية للمادة او لمجموعة المركبات المكونة للمادة اذا كانت مخلوط
التحليل الكيفى	يتم فيها الكشف عن العناصر و المجموعات الوظيفية الموجودة بغرض التعرف على المركب
التحليل الكمي	يتم فيه التعرف على الايونات التى يتكون منها المركب غير العضوى و يشمل الكشف عن الكاتيونات (الشق القاعدى او الايون الموجب) و الانيونات (الشق الحمضى أو الايون السالب) .
التحليل الحجمى	يهدف الى التعرف على مكونات المادة سواء كانت نقية (ملحا بسيطا) أو مخلوط من عدة مواد.
الحساب الكيمائى	او سلسلة من التفاعلات المختارة المناسبة تجرى للكشف عن نوع المكونات الاساسية للمادة على اساس التغيرات الحادثة للتفاعلات
التحليل الوزنى	تحليل كيميائى يستخدم في التعرف على نسبة كل مكون من المكونات الاساسية للمادة
طريقة التطاير	تحليل كيميائى يعتمد على قياس حجوم المواد المراد تقديرها
طريقة الترسيب	هو تقدير كميات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة.
ورق ترشيح عديم الرماد	تحليل كيميائى يعتمد على فصل المكون المراد تقديره ثم تعين كتلته
	طريقة للتحليل الوزنى تعتمد على تطاير العنصر او المركب المراد تقديره
	طريقة للتحليل الوزنى تعتمد على فصل العنصر او المكون المراد تقديره على هيئة مركب (نقي) غير قابل للذوبان في الماء وذو تركيب كيميائى ثابت ومعروف
	نوع من ورق الترشيح يحترق احتراقا كاملا ولا يترك أي رماد

محلول ٥% من هيدروكسيد الصوديوم	كل ١٠٠ جرام من الماء تحتوى ٥ جم من NaOH
محلول ٠.١ مولارى من حمض الكبريتيك	كل لتر من المحلول يحتوى ٠.١ مول من الحمض
مخلوط 5p.p.m من كربونات الصوديوم	أن كل ١.٠٠٠.٠٠٠ (مليون) جزء من المخلوط يحتوى ٥ جزء من (Na ₂ CO ₃)
المجموعة التحليلية الخامسة	ترسب كاتيونات هذه المجموعة على هيئة كربونات بإضافة محلول كربونات الامونيوم
المجموعة التحليلية الثالثة	ترسب كاتيونات هذه المجموعة على هيئة هيدروكسيدات بإضافة هيدروكسيد الامونيوم
المجموعة التحليلية الثانية	ترسيب كاتيونات هذه المجموعة على هيئة كبريتيدات فى الوسط الحمضى
المول	هو كمية المادة التى تحتوى على عدد أفوجادروا من الجسيمات (جزيئات أو ذرات أو أيونات أو وحدات صيغة أو إلكترونات)
الكتلة المولية	مجموع الكتل الذرية للعناصر الداخلة فى تركيب الجزيء أو وحدة الصيغة مقدرة بوحدة الجرام
عدد أفوجادروا	عدد الجزيئات أو الذرات أو الايونات الموجودة فى واحد مول من أى مادة و يساوى 6.02×10^{23}
الحجم الجزيئى	الحجم الذى تشغله الكتلة الجزيئية من أى غاز فى STP ويساوى 22,4 لتر (STP هي معدل الضغط ودرجة الحرارة الثابتين)
كثافة الغاز	كتلة وحدة الحجم من أى غاز فى STP
المحلول المولارى	محلول يحتوى اللتر منه على واحد مول من المذاب
التركيز المولارى	عدد المولات المذابة فى حجم معين من المذيب
المعايرة	(عملية تعين تركيز حجم معلوم من مادة بمعلومية تركيز حجم معين من مادة اخري) او (عملية يتم فيها إضافة حجم معلوم من محلول مادة معلومة التركيز إلى محلول مادة مجهولة التركيز)
نقطة التعادل	هى النقطة التى يتم عندها تمام تفاعل التعادل بين الحمض و القاعدة
الادلة الكيميائية	مواد كيميائية يتغير لونها بتغير وسط التفاعل و تستخدم للتعرف على نقطة نهاية التفاعل
المحلول القياسي	مادة معلومة الحجم و التركيز تستخدم فى قياس مادة مجهولة
تفاعلات التعادل	تفاعلات تستخدم فى تقدير تركيز الأحماض و القواعد
تفاعلات أكسدة و اختزال	تفاعلات تستخدم فى تقدير تركيز المواد المؤكسدة و المختزلة
تفاعلات الترسيب	تفاعلات تستخدم فى تقدير تركيز المواد التى يمكن أن تعطى نواتج شحيحة الذوبان فى الماء
قانون أفوجادرو *معلومات عامة*	الحجوم المتساوية من الغازات تحت نفس الظروف من درجة الحرارة والضغط تحتوى على أعداد متساوية من الجزيئات فى م.ض.د.
قانون جاى لوساك *معلومات عامة*	حجوم الغازات الداخلة فى التفاعل والنتيجة من التفاعل تكون بنسب محددة.

المفهوم	المصطلح العلمي (الباب الثالث)
النظام المتزن	نظام ساكن على المستوى المرئى وديناميكي على المستوى غير المرئى في اتجاهين متعاكسين وبنفس السرعة
الضغط البخارى	هو ضغط بخار الماء الموجود في الهواء الجوى عند درجة حرارة معينة
ضغط بخار الماء المشبع	أقصى ضغط لبخار الماء يمكن أن يتواجد في الهواء عند درجة حرارة معينة
التفاعلات التامة	هى التفاعلات التى تسير فى اتجاه واحد وذلك لخروج أحد النواتج من حيز التفاعل بالتصعيد أو الترسيب.
التفاعلات الانعكاسية	هى تفاعلات تحدث فى الاتجاهين الطردى والعكسى وذلك لوجود النواتج والمتفاعلات دائماً فى حيز التفاعل.
الاتزان الكيميائى في التفاعل الانعكاسي	هو نظام ديناميكي يحدث عندما يتساوى معدل التفاعل الطردى مع معدل التفاعل العكسى و تثبت تراكيزات المتفاعلات و النواتج
معدل التفاعل	هو مقدار التغير فى تركيز المواد المتفاعلة فى وحدة الزمن.
قانون فعل الكتلة	عند ثبوت درجة الحرارة تتناسب سرعة التفاعل الكيميائى تناسباً طردياً مع حاصل ضرب تراكيزات المواد المتفاعلة كل مرفوع إلى أس يساوى عدد الجزيئات أو الأيونات
طاقة التنشيط	هى الحد الأدنى من الطاقة التى يجب أن يكتسبها الجزيء لى يتفاعل عند الاصطدام.
الجزيئات المنشطة	هى الجزيئات ذات الطاقة الحركية المساوية لطاقة التنشيط أو تفوقها.
قاعدة لوشاتيليه	إذا حدث تغير فى أحد العوامل المؤثرة على نظام فى حالة اتزان مثل التركيز أو الضغط أو درجة الحرارة فإن النظام ينشط فى الاتجاه الذى يقلل أو يلغى تأثير هذا التغير.
الإنزيمات	جزيئات من البروتين تتكون داخل الخلايا الحية تعمل كعوامل حفز للعديد من العمليات البيولوجية و الصناعية
العامل الحفاز	مادة يلزم منها القليل لتغير معدل التفاعل الكيميائى دون أن تتغير أو تغير من وضع الاتزان.
أيون الهيدرونيوم	هو الأيون الناتج من اتحاد أيون الهيدروجين الموجب الناتج من تأين الأحماض فى محاليلها المائية مع جزيء الماء
التأين	عملية تحويل جزيئات غير متأينة إلى أيونات
التأين التام	يحدث فى الإلكتروليتات القوية وفيه تتحول كل الجزيئات الغير متأينة إلى أيونات.
التأين الغير التام	يحدث فى الإلكتروليتات الضعيفة وفيه يتحول جزء من الجزيئات الغير متأينة إلى أيونات.
الاتزان الأيونى	نوع من الإتزان ينشأ فى محاليل الإلكتروليتات الضعيفة بين جزيئاتها و بين الأيونات الناتجة .
الحاصل الأيونى للماء	هو حاصل ضرب تركيز أيون الهيدروجين وأيون الهيدروكسيل الناتجين عن تأين الماء ويساوى 10^{-14} مول/لتر.
الأس الهيدروجينى	هو اللوغاريتم السالب (للأساس ١٠) لتركيز أيون الهيدروجين (pH)
الأس الهيدروجينى (pH)	أسلوب للتعبير عن درجة الحموضة أو القاعدية للمحاليل المائية بأرقام من الصفر إلى ١٤
الأس الهيدروكسيلي	هو اللوغاريتم السالب (للأساس ١٠) لتركيز أيون الهيدروكسيل (pOH)

حاصل الإذابة K_{sp}	هو حاصل ضرب تركيز أيوناته مقدرة بالمول / لتر مرفوع كل منها لأس يساوي عدد الأيونات التي توجد في حالة إتران مع محلولها المشبع .
قانون استفالد	عند درجة الحرارة الثابتة تزداد درجة التأين (α) بزيادة التخفيف لتظل قيمة ثابت الاتزان (K_a) ثابتة $K_a = \frac{\alpha^2}{V(1-\alpha)}$
التميو	تفاعل الملح مع الماء لتكوين الحمض و القلوى المشتق منهما الملح
التعادل	تفاعل الحمض و القلوى المشتق منهما الملح لتكوين الملح مع الماء
ثابت الاتزان	النسبة بين ثابت معدل التفاعل الطردى و ثابت معدل التفاعل العكسى
المحاليل الالكتروليتيية	محاليل المواد التي تتفكك أيونيا عند ذوبانها فى الماء و توصل التيار الكهربى
المحاليل اللا الالكتروليتيية	محاليل المواد التي لا تتفكك أيونيا عند ذوبانها فى الماء و لا توصل التيار الكهربى
الاتجاه العكسى	هو اتجاه التفاعل من النواتج الى المتفاعلات
الاتجاه الطردى	هو اتجاه التفاعل من المتفاعلات الى النواتج
تفاعلات لحظية سريعة	هي تفاعلات تحدث في فترة زمنية قصيرة
تفاعلات بطيئة نسبياً	هي تفاعلات تحدث في فترة زمنية طويلة
تفاعلات بطيئة جداً	هي تفاعلات تحدث في فترة زمنية طويلة جداً تأخذ عدة شهور
المفهوم	المصطلح العلمى (الباب الرابع)
علم الكيمياء الكهربية	علم يهتم بدراسة التحول المتبادل بين الطاقة الكيميائية و الطاقة الكهربائية من خلال تفاعل أكسدة و اختزال
تفاعلات الأكسدة والاختزال	هي التفاعلات التي تنتقل فيها الإلكترونات من أحد المواد المتفاعلة إلى المادة الأخرى الداخلة معها فى تفاعل كيميائى
الخلايا الكهروكيميائية	أنظمة أو أجهزة تستخدم فى تحويل الطاقة الكيميائية إلى كهربية والعكس
الخلايا الإلكتروليتية	خلايا يتم فيها تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية فى شكل تفاعلات أكسدة واختزال غير تلقائية.
الخلايا الجلفانية	أنظمة تختزن الطاقة فى صورة طاقة كيميائية و التي يمكن تحويلها عند اللزوم إلى طاقة كهربية من خلال تفاعل أكسدة و اختزال تلقائى غير
الخلايا الأولية	خلايا جلفانية تتحول فيها الطاقة الكيميائية المختزنة إلى طاقة كهربية من خلال تفاعل تلقائى غير انعكاسى.
الخلايا الثانوية	خلايا جلفانية تتميز بأن تفاعلاتها الكيميائية انعكاسية (يمكن إعادة شحنها) وتختزن الطاقة الكهربائية على هيئة طاقة كيميائية.
القنطرة الملحية	إنبوبة زجاجية على شكل حرف U تملأ بمحلول إلكتروليتى مثل كبريتات الصوديوم لا تتفاعل أيوناته مع أيونات محاليل نصفى الخلية و لا مع مواد أقطاب الخلية
الأنود (المصعد)	القطب الذى تحدث عنده عملية الأكسدة فى الخلايا الكهروكيميائية.
الكاثود (المهبط)	القطب الذى تحدث عنده عملية الاختزال فى الخلايا الكهروكيميائية.
قطب الهيدروجين	قطب قياسى ذو جهد ثابت و معلوم (صفر) يستخدم فى قياس جهود

سلسلة الجهود الكهربائية	هي ترتيب العناصر تنازلياً حسب جهود الاختزال السالبة و تصاعدياً حسب جهود الاختزال الموجبة هي ترتيب العناصر تنازلياً حسب جهود الأكسدة الموجبة و تصاعدياً حسب جهود الأكسدة السالبة
فرق الجهد الكهربى (القوة الدافعة)	الفرق بين جهدى التأكسد او مجموع جهدى التأكسد والاختزال الفرق بين جهدى الاختزال لقطبى الخلية.
خلية الزئبق	خلية صغيرة الحجم شائعة الاستخدام فى سماعات الأذن والساعات.
خلية الوقود	خلية تستخدم فى إطلاق الصواريخ
الدينامو	يستخدم فى السيارة و بصورة مستمرة فى إعادة شحن البطارية أولاً بأول
بطارية الليثيوم	تستخدم فى أجهزة المحمول و الكمبيوتر المحمول و كبديل لبطارية السيارات الحديثة
صدا الحديد	عملية تآكل كيميائى للفلزات بفعل الوسط المحيط او تفاعلات أكسدة واختزال غير مرغوب فيها
الغطاء الكاثودى	يقصد بها تغطية الفلز بفلز آخر أقل منه نشاطاً
الغطاء الانودى	يقصد بها تغطية الفلز بفلز آخر أكثر منه نشاطاً
القطب المضحي	فلز أكثر نشاط يوصل بالقطب الموجب لمصدر كهربى فيتآكل هو و يحمى الفلز الأقل نشاط من التآكل
التحليل الكهربى	التحلل الكيميائى للمحلول الالكترولى بفعل مرور التيار الكهربى
موصلات إلكترونية سائلة	مواد توصل التيار الكهربى عن طريق حركة أيوناتها الموجبة و السالبة
موصلات إلكترونية	مواد توصل التيار الكهربى عن طريق حركة إلكتروناتها
الكولوم	كمية الكهربائية التى تؤدى إلى ترسيب ١.١١٨ مجم من الفضة
الأمبير	وحدة قياس شدة التيار الكهربى و هو كمية الكهرباء التى إذا تم تمريرها لمدة ثانية واحدة فى محلول أيونات الفضة يتم ترسيب 1,118 mg من
القانون الأول لفاراداي	تناسب كمية المواد المتكونة أو المستهلكة عند أى قطب سواء كانت غازية أو صلبة تناسباً طردياً مع كمية الكهرباء التى تمر فى المحلول الإلكترولى.
القانون الثانى لفاراداي	كتلة المواد المختلفة المتكونة أو المستهلكة بمرور نفس كمية الكهرباء فى عدة إلكتروليات متصلة على التوالى تتناسب مع كتلتها المكافئة.
الفاراداي	هو كمية التيار المطلوبة لترسيب أو إذابة الكتلة المكافئة الجرامية لأى عنصر آخر بناء على القانون الثانى لفاراداي
القانون العام للتحليل الكهربى	عند مرور واحد فارادى (٩٦٥٠٠ كولوم) خلال إلكترولى فإن ذلك يؤدى إلى ذوبان أو تصاعد أو ترسيب كتلة مكافئة جرامية من المادة عند أحد
الكتلة الجرامية المكافئة	هى كتلة المادة التى لها القدرة على فقد أو اكتساب مول واحد من الإلكترونات أثناء التفاعل الكيميائى
الكمية الكهربائية	هى حاصل ضرب شدة التيار الكهربى (بالأمبير) $\times$ الزمن (بالثانية)
الطلاء بالكهرباء	عملية تكوين طبقة رقيقة من فلز معين على سطح فلز آخر.

مفاهيم الباب الرابع	
كيمياء الكربون علم الكيمياء	العلم الذي يهتم بدراسة مركبات عنصر الكربون باستثناء أكاسيد الكربون و أملاح الكربونات (- CO3) و السيانيد (- CNO)
علم الكيمياء الغير عضوية	العلم الذي يهتم بدراسة باقى العناصر عدا الكربون و عددها ١١١ عنصر او أكثر
نظرية القوة الحيوية	تتكون المركبات العضوية داخل الخلايا الحية فقط بواسطة قوى حيوية و لا يمكن تكوينها في المختبر
اليوريا	المركب العضوي الناتج من تسخين كلوريد الأمونيوم مع سيانات الفضة
الهيدروكربونات	مركبات عضوية تتكون من عنصري الكربون والهيدروجين فقط
الصيغة الجزيئية	صيغة تبين نوع وعدد ذرات كل عنصر فى المركب ولا تبين طريقة ارتباطها معاً فى الجزيء
الصيغة البنائية	صيغة تبين نوع وعدد الذرات لكل عنصر فى الجزيء وطريقة ارتباطها مع بعضها بالروابط التساهمية
المشابهة الجزيئية (الأيزومورزم)	هى ظاهرة اشتراك أكثر من مركب عضوى فى صيغة جزيئية واحدة واختلافهما فى الصيغة البنائية مما يودى إلى اختلاف الخواص الفيزيائية والكيميائية
التكسير الحراري الحفزي	هى عملية تحويل النواتج البترولية الطويلة و الثقيلة إلى جزيئات أصغر و أخف
المركبات المشبعة	مركبات توجد بين ذرات الكربون فى جزيئاتها روابط أحادية فقط
المركبات الغير المشبعة	مركبات توجد بين ذرات الكربون فى جزيئاتها رابطة ثنائية او ثلاثية واحدة او أكثر
الألكانات (برفينات)	هيدروكربونات مشبعة أليفاتية صيغتها العامة C_nH_{2n+2}
الألكينات (الوفينات)	هيدروكربونات غير مشبع أليفاتية تتميز باحتوائها على روابط ثنائية بين ذرات الكربون.
الالكينات (استيلينات)	هيدروكربونات غير مشبع أليفاتية تتميز باحتوائها على روابط ثلاثية بين ذرات الكربون. صيغتها العامة C_nH_{2n-2}
الألكانات الحلقية	هيدروكربونات حلقية مشبعة صيغتها العامة C_nH_{2n}
مجموعة الألكيل	مجموعة ذرية لا توجد منفردة وتشتق بنزع ذرة هيدروجين من جزيء الألكان
مجموعة الأريل (شق الفينيل)	الشق الناتج من نزع ذرة هيدروجين من جزيء البنزين
السلسلة المتجانسة	مجموعة من المركبات يجمعها قانون جزيئى عام وتتشترك فى الخواص الكيميائية وتتدرج فى الخواص الفيزيائية و يزيد كل مركب عن الذى يسبقه بمقدار (- CH2 -)
نظام الأيوباك (IUPAC)	هو نظام عالمى لتسمية المركبات العضوية حسب عدد ذرات الكربون فى أطول سلسلة كربونية (الإتحاد الدولى للكيمياء البحتة و التطبيقية)

النظام الشائع	هو تسميه المركبات العضوية حسب مصدرها الذي استخلصت منه
الغاز المائي	خليط من غازي الهيدروجين وأول أكسيد الكربون ويستخدم كعامل مختزل أو وقود قابل للاشتعال
البلمرة بالإضافة	عملية إضافة عدد كبير من جزيئات مركب صغير غير مشبع إلى بعضها لتكوين جزيء كبير
البلمرة بالتكاثف	اتحاد مونمرين مختلفين مع فقد جزيء ماء لتكوين بوليمر مشترك أو بلمرات مشتركة تنتج من ارتباط نوعين من المونمر مع خروج جزيء صغير مثل جزيء الماء
١،١،١ ثلاثي كلورو إيثان	مركب عضوي هالوجيني يستخدم في التنظيف الجاف
الجير الصودي (الهالوثان)	خليط من الصودا الكاوية والجير الحي
الفريونات	مركب من الألكانات الهالوجينية يستخدم كمخدر بأمان.
الهدرجة	مشتقات هالوجينية للألكانات مثل رابع فلوريد الميثان (CF_4) وثنائي كلور و ثنائي فلورو الميثان ($CF_2 Cl_2$) وتستخدم في أجهزة التكييف
كشف باير	إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية لتحويلها إلى مسلي صناعي
الهيدرة الحفزية	إمرار الإيثين (الألكينات) في محلول برمنجنات البوتاسيوم في وسط قلوي حيث يزول لون برمنجنات البوتاسيوم
كحول الفينيل	عملية إضافة الماء إلى الألكينات أو الألكينات في وجود عامل حفاز
الجلايكولات	كحول غير مشبع ينتج كمركب وسطي عند الهدره الحفزية للإيثاين
قاعدة ماركونيكوف	مركبات ثنائية الهيدروكسيل تنتج من أكسدة الألكينات بالعوامل المؤكسدة مثل برمنجنات البوتاسيوم أو فوق أكسيد الهيدروجين
الكين متماثل	عند إضافة متفاعل غير متماثل إلى الكين غير متماثل فإن الجزء الموجب من المتفاعل يضاف إلى ذرة الكربون الأكثر هيدروجين والجزء السالب إلى ذرة الكربون الأقل هيدروجين
الكين غير متماثل	الكين فيه ذرتي الكربون المتصلتين بالرابط المزدوجة تحتويان نفس العدد من ذرات الهيدروجين
تفاعل فريدل كرافت (الألكلة)	الكين فيه ذرتي الكربون المتصلتين بالرابط المزدوجة تحتويان عدد غير متساوي من ذرات الهيدروجين
النيترة	تفاعل البنزين مع هاليد الأكيل RX في وجود كلوريد ألومنيوم لا مائي والتسخين فتحل مجموعة أكيل محل ذرة هيدروجين ويتكون أكيل بنزين
السلفنة	تفاعل البنزين مع حمض النيتريك في وجود حمض الكبريتيك المركز فتحل مجموعة النيترو NO_2 - محل ذرة هيدروجين في حلقة البنزين.
البوتاجاز	تفاعل البنزين مع حمض الكبريتيك المركز لتحل مجموعة السلفونيك - (SO_3H) محل ذرة هيدروجين ويتكون حمض بنزين السلفونيك.
المنظفات الصناعية	خليط من البروبان والبيوتان يسال ومعبأ في اسطوانات ويستخدم كوقود
	مركبات عضوية هامة تنتج عند معالجة مركبات أكيل حمض بنزين سلفونيك بواسطة الصودا الكاوية.

الفينولات	مركبات عضوية تحتوي على مجموعة أو أكثر من مجموعات الهيدروكسيل متصلة بمجموعة أريل
الكحولات	مركبات عضوية تحتوي على مجموعة أو أكثر من مجموعات الهيدروكسيل متصلة بمجموعة ألكيل
كحولات أولية	كحولات ينتج عن أكسدة ألددهيدات ثم أحماض كربوكسيلية و تتصل فيها ذرة الكربون بذرة كربون واحدة و ذرتين هيدروجين و تحتوي على المجموعة CH_2OH - في تركيبها
كحولات ثانوية	كحولات تتصل فيها ذرة الكربون بذرتي كربون وذرة هيدروجين واحدة و تحتوي على المجموعة CHOH -
كحولات ثالثة	كحولات تتصل فيها ذرة الكربون بثلاث ذرات كربون و تحتوي على المجموعة و غير قابلة واحدة و تحتوي على المجموعة COH -
التخمير الكحولي	إضافة الخميرة الى المولاس (بقايا قصب السكر " سكروز " بعد صناعته) فيتكون الإيثانول وثاني أكسيد الكربون
الكحول المحول (السبرتو الأحمر)	الإيثانول مضاف اليه مادة سامة صعبة الفصل مثل الميثانول (يسبب الجنون والعمى) و بيريدين (رائحته كريهة) و بعض الصبغات لتلوينه
الكربوهيدرات	ألددهيدات أو كيتونات عديدة الهيدروكسيل
كيتونات	مركبات عضوية تنتج عند أكسدة الكحولات الثانوية.
الأسطرة	تفاعل الكحولات مع الأحماض الكربوكسيلية في وجود مادة نازعة للماء مثل حمض الكبريتيك.
الروابط الهيدروجينية	نوع من الروابط مسئول عن ذوبان الكحولات الخفيفة في الماء وكذلك ارتفاع درجة غليانها.
أحماض عضوية	مركبات عضوية تتميز باحتوائها على مجموعة كربوكسيل أو أكثر.
جليسريدات ثلاثية	إسترات ناتجة من تفاعل الجليسرول مع الأحماض الكربوكسيلية العالية. (الزيوت والدهون) صناعة الصابون والجليسرين
جزئ الأنسولين	بروتين ينتج من تكاثف ٥١ جزئ لستة عشر حمضاً أمينياً
التحلل النشادرى	تتفاعل الأسترات مع الأمونيا لتكون أميد الحامض والكحول .
كشف الحموضة	تفاعل الأحماض الكربوكسيلية مع كربونات أو بيكربونات الصوديوم.
بروتينات	بوليمرات طبيعية تنتج من تكاثف الأحماض الأمينية مع بعضها مثل جزئ
قاعدية الحمض	عدد مجموعات الكربوكسيل الموجود في جزئ الحمض العضوى.
التحلل المائى القاعدى	غليان الأسترات مع محلول قلوى قوى مثل هيدروكسيد الصوديوم أو التحلل المائى للأسترات للدهون أو الزيوت بالتسخين وسط قلوى
لهب الأكسي اسيتلين	اللهب الناتج من احتراق غاز الايثان في كمية وفيرة من الهواء عند (٣٠٠٠ درجة م) ولذا يستخدم اللهب في لحام وقطع المعادن
المجموعة الوظيفية الفعالة	مجموعة من الذرات مرتبطة بشكل معين و تمثل ركنا من المركب ولكن فعاليتها تغلب على خواص الجزئ بأكمله
الداكرون	بوليمر ينتج من تفاعل الإيثيلين جليكول مع حمض تير فتاليك و هو خامل كيميائياً و لذلك يستخدم فى صناعة الأنابيب المستخدمة الشرايين التالفة
الأسبرين (أستيل حمض السلسليك)	إستر ناتج من تفاعل حمض السلسليك مع حمض الأسيتيك و من أهم العقاقير التى تخفف آلام الصداع وتخفف درجة الحرارة وتقلل من تجلط الدم فيمنع حدوث الأزمات القلبية

السؤال الثاني اذكر دور العلماء في تقدم الكيمياء

العالم	أهم أعماله
العالم افوجادرو	حدد ان المول الواحد من اى مادة يحتوى على عدد ثابت من الجزيئات او الذرات او الايونات و يساوى 6.02×10^{23} حدد ان المول من اى غاز يشغل حجماً قدره ٢٢.٤ لترا فى الظروف القياسية وضع قانون يحدد العلاقة بين حجوم الغازات و مقدار ما يحتويه من جزيئات
جاي - لوساك	وضع قانون يحدد العلاقة بين حجوم الغازات الداخلة فى التفاعل و الناتجة
جولد برج وفاج	اوجد القانون الذى يعبر عن العلاقة بين سرعة التفاعل وتركيز المواد المتفاعلة (قانون فعل الكتلة) والتي تنص على عند ثبوت درجة الحرارة تتناسب سرعة التفاعل الكيميائى تناسباً طردياً مع حاصل ضرب التركيزات الجزيئية لمواد التفاعل كل مرفوع لاس يساوي عدد الجزيئات او الايونات
لوشاتلييه	وضع قاعده تعرف باسمه تصف تأثير العوامل المختلفه من تركيز وحرارة وضغط على الأنظمة المتزنة التي تنص على اذا حدث تغير فى أحد العوامل المؤثرة على نظام فى حالة إتزان مثل التركيز و الضغط و درجة الحرارة فإن التفاعل ينشط فى الإتجاه الذى يقلل أو يلغى تأثير هذا التغير .
استفاله	يحدد العلاقة الكمية بين درجة التاين (ألفا α) و التركيز (C) بالمول/لتر.
جلفاني	وضع اسس الخلايا جلفانية التي تنص على أنظمة تستخدم فى تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية من خلال تفاعل أكسدة و اختزال يتم بشكل تلقائى
(دانيال)	استطاع فصل نصفى الأكسدة والاختزال وسميت هذه الخلايا بالخلايا الجلفانية
فاراداي	قام باستنتاج العلاقة بين كمية الكهرباء التى تمر فى المحلول و بين كمية المادة التى يتم تحريرها عند الأقطاب ، و لخص هذه العلاقة فى قانونين سميا باسمه
برزيليوس	❖ قسم العناصر إلى فلزات و لا فلزات ❖ قسم المركبات لعضوية و غير عضوية * صاحب نظرية القوى الحيوية.
فوهلر	هدم نظرية القوى الحيوية حيث تمكن من تحضير اليوريا (البولينا) فى بول الثدييات من تسخين محلول مائى لمركبين غير عضويين هما كلوريد الامونيوم وسيانات الفضة
كيكولي	توصل إلى الشكل السداسى الحلقى الذى تتبادل فيه الروابط المزدوجة والروابط الأحادية و الدائرة داخل حلقة البنزين تعنى عدم تمركز الإلكترونات الستة عند ذرات كربون معينة

السؤال الثالث كيف تميز ركز VIP

وجه التميز	الفينولفيثالين	الميثيل البرتقالي
إضافة قطرات من كلا منهما الى حمض هيدروكلوريك مخفف	عديم اللون	لون احمر
وجه التميز	مركب عضوى	مركب غير عضوى
بإمرار التيار الكهربى فى محلول	لا يمر التيار الكهربى	يمر التيار الكهربى

المراجعة النهائية ٣ ث

٠١٠٠٨٨٤٦٦٣١/ت



/D.M.RAZK

موقع الدكتور محمد رزق معلم الكيمياء للثانوية التعليمي

وجة التميز	حمض الخليك	خمض خليك الثلجي
(بطارية ومصباح كهربائي)	يضئ المصباح	لا يضئ المصباح

وجة التميز	كلوريد صوديوم	كلوريد أمونيوم
ورقتي عباد شمس مبلتين بالماء	لا يتغير لون ورقتي عباد الشمس	يتحول لون عباد الشمس الزرقاء إلى الأحمر

وجة التميز	الفينول	حمض الخليك	الكحول الايثيلي	ثيوسيانات
	حمض الكربوليك	(الاستيك) (الايثانويك)	الكحول المطلق	الألومنيوم
محلول كلوريد حديد III	لون بنفسجي	لا يحدث تفاعل	لا يحدث تفاعل	لون أحمر دموي
كربونات أو بيكربونات الصوديوم	لا يحدث تفاعل	يحدث فوران ويتصاعد ثاني أكسيد الكربون يعكر ماء الجير	لا يحدث تفاعل	-----
حمض الخليك	لا يحدث تفاعل	لا يحدث تفاعل	يتكون استر له رائحة مميزة	-----
كحول ايثيلي	لا يحدث تفاعل	يتكون استر له رائحة مميزة	لا يحدث تفاعل	-----

وجة التميز	الايثان	الايثين	الايثانين
	الكان مشبع	الكين غير مشبع	الكين غير مشبع
البروم الأحمر المذاب في رابع كلوريد الكربون	لا يزول اللون	يزول اللون الأحمر	يزول اللون الأحمر
برمنجنات البوتاسيوم البنفسجية في وسط قلوي	لا يزول اللون	يزول اللون البنفسجي ويتكون الإيثيلين جليكول عديم اللون	لا يزول اللون

وجة التميز	كحول أولي	كحول ثانوي	كحول ثالثي
	٢-ميثيل ١-بروبانول	٢-بروبانول	٢-ميثيل ٢-بروبانول
برمنجنات البوتاسيوم البنفسجية في وجود ورقة عباد شمس زرقاء	يزول اللون وتساعدت رائحة الخل و تحول ورقة عباد الشمس للأحمر كان كحول أولي بسبب تكون حمض الأسستيك (الخليك)	يزول اللون لم يتغير لون ورقة عباد الشمس كان كحول ثانوي لتكون الكيتون الذي لا يتأكسد و لا يؤثر على عباد الشمس	لا يزول اللون
ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك البرتقالية	يتحول للأخضر	يتحول للأخضر	لا يتغير اللون

وجه التميز	كلوريد الأمونيوم	خلات (أسيئات) الأمونيوم
ورقة عباد شمس	تتحول الورقة الزرقاء إلى اللون الأحمر	لا يتغير لون ورقتي عباد الشمس

وجه التميز	الأسبرين	وزيت المروخ
كلوريد الحديد III	لا يحدث شيء	يتكون لون بنفسجي
كربونات الصوديوم	يحدث فوران ويتصاعد غاز ثاني أكسيد كربون يعكر ماء الجير	لا يحدث شيء

وجه التميز	الإيثانول	إيثير ثنائي الميثيل
برمنجانات بوتاسيوم محمضة بنفسجية	يزول اللون	لا يحدث شيء
ثاني كرومات بوتاسيوم محمضة برتقالية	يتحول اللون للأخضر	لا يحدث شيء
قطعة صوديوم	يتصاعد غاز الهيدروجين يشتعل بفرقة	لا يحدث شيء
حمض العضوية مثل حمض الخليك	تظهر رائحة الإستر الزكية	لا يحدث شيء

وجه التميز	كربونات الصوديوم	بيكربونات الصوديوم
كبريتات الماغنسيوم	راسب أبيض على البارد	راسب أبيض بعد التسخين

وجه التميز	كبريتيد الصوديوم	كبريتيت الصوديوم
نترات الفضة	راسب أسود	راسب أبيض يسود بالتسخين

وجه التميز	كبريتات الصوديوم	فوسفات الصوديوم
كلوريد الباريوم	راسب أبيض لا يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف	راسب أبيض يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف

وجه التميز	كلوريد حديد ثنائي	كلوريد حديد ثلاثي
هيدروكسيد الصوديوم	راسب أبيض مخضر	راسب بني محمر

السؤال الرابع : اهم اسئلة رتب في المنهج

١- : رتب عناصر السلسلة الانتقالية الرئيسية الاولى حسب النسبة المئوية بالوزن :

حديد < تيتانيوم < منجنيز < فانيوم < كروم < نيكل < خارطين < نحاس < كوبلت < اسكانديوم

٢- رتب حسب الهالوجينات حسب سهولة انتزاعها:

يود < بروم < كلور

يوديد الألكيل أسهلها تحلل بسبب كبر نصف قطر ذرة اليود و ضعف ارتباطها بمجموعة الألكيل

٣- إذا علمت أن ثابت تأين حمض الكبريتوز وحمض الهيدروفلوريك وحمض النيتروز وحمض الخليك وحمض البوريك وحمض الكربونيك هي:

اعداد الدكتور محمد رزق
 $10^{-1.7}$ ، $10^{-6.2}$ ، $10^{-5.1}$ ، $10^{-1.8}$ ، $10^{-5.8}$ ، $10^{-4.4}$ ، 10^{-7} على الترتيب . رتب هذه الأحماض حسب قوتها تصاعدياً .

الحل:

الكبريتوز < الهيدروفلوريك < النيتروز < الخليك < الكربونيك < البوريك
 لأن قوة الحمض تتناسب طردياً مع ثابت تأينه .

٤- رتب حسب النشاط الكيميائي (قوة الرابطة) :

البروبان الحلقي (6) > البيوتان الحلقي (9) > الهكسان الحلقي (16) > البروبان العادي (18)
 تؤدي الزوايا الصغيرة إلى تداخل ضعيف بين الأوربيتالات الذرية ويكون الارتباط بين ذرات الكربون ضعيفاً لذا فهي نشيطة للغاية و لذلك فإن البروبان الحلقي أكثر نشاطاً من البروبان المستقيم

٥- رتب الأصناف التالية ترتيباً تصاعدياً كعوامل مختزلة :

١. Zn^{+2} / Zn (- 0.762 volt) (لاحظ يا عمنا ان الخارصين اختزال)
٢. Mg / Mg^{+2} (2.375 volt) اعداد الدكتور محمد رزق
٣. $2Cl^{-} / Cl_2$ (- 1.36 volt)
٤. K^{+} / K (- 2.924 volt) (لاحظ يا عمنا ان البوتاسيوم اختزال)

الحل : للترتيب كعوامل مختزلة ، نرتب حسب جهود الأكسدة فأكثر قيمة هو أقوى عامل مختزل .

الخارصين	الماغنسيوم	الكلور	البوتاسيوم
٠,٧٦٢ فولت	٢,٣٧٥ فولت	١,٣٦ فولت	٢,٩٢٤ فولت

الكلور > الخارصين > الماغنسيوم > البوتاسيوم

٦- رتب الكحولات الآتية حسب درجة الغليان أو حسب الذوبان في الماء مع ذكر السبب:

السوربيتول (6OH) < الجليسرول (3OH) < الإيثيلين جليكول (2OH) < الميثانول (OH)

لزيادة عدد مجموعات الهيدروكسيل في السوربيتول عن الباقي وكلما زاد عدد مجموعات الهيدروكسيل زادت درجة الغليان وقابلية الذوبان في الماء

اعداد الدكتور محمد رزق

٧- رتب المواد الآتية حسب الصفة الحامضية:

حمض معدني < حمض أروماتي < حمض أليفاتي < فينول < كحول < قلوي (هيدروكسيد صوديوم)

٨- رتب المواد العضوية تنازلياً حسب درجة الغليان:

الأحماض الأليفاتية > الأحماض الأروماتية > كحولات عديدة الهيدروكسيل > كحولات ثلاثية الهيدروكسيل
> كحولات ثنائية الهيدروكسيل > كحولات أحادية الهيدروكسيل > الأسترات > الألكانات

السؤال الخامس علل لما يأتي الباب الاول

تتكون كل سلسلة من سلاسل العناصر الانتقالية من عشرة أعمدة رأسية؛

ج/ لأنها يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي (d) الذي يتسع لعشرة إلكترونات.

تختلف المجموعة الثامنة عن بقية المجموعات (B)؛

ج/ لوجود تشابه بين عناصرها الأفقية أكبر من التشابه بين عناصرها الرأسية.

تضاف الاسكانديوم الي الألومنيوم صناعة طائرات الميج المقاتلة؛

ج/ لخفتها وشدة صلابتها.

الاسكانديوم تضاف الي مصابيح أبخرة الزئبق التي تستخدم في التصوير أثناء الليل

ج/ لأنها تنتج ضوء عالي يشبه ضوء الشمس.

يستخدم التيتانيوم في زرع الاسنان والمفاصل الصناعية

ج/ لان الجسم لا يلفظه ولا يسبب اي نوع من التسمم

يستخدم ثاني اكسيد التيتانيوم (TiO_2) في تركيب مستحضرات الحماية من أشعة الشمس

ج/ حيث تعمل الدقائق النانوية علي منع وصول الأشعة فوق البنفسجية للجلد.

يضاف الفانديوم بنسبة ضئيلة منه الي الصلب في صناعة زفبركات السيارات

ج/ لأنها تتميز بقساوة عالية وقدرة كبيرة علي مقاومة التآكل

الكروم علي درجة عالية من النشاط الكيميائي لكنه يقاوم فعل العوامل الجوية

ج/ بسبب تكون طبقة من الأكسيد الغير مسامية علي سطحه تمنع استمرار تفاعل الكروم مع

أكسجين الجو ويرجع ذلك ان حجم جزيئات الأكسيد المتكون أكبر من حجم ذرات العنصر نفسه

لا يستخدم المنجنيز وهو في حالته النقية ولكن يستخدم في صورة سبائك ومركبات

ج/ لهشاشته الشديدة

تستخدم سبائك الحديد مع المنجنيز في صناعة خطوط السكك الحديدية

ج/ لأنها اصلب من الصلب.

تستخدم سبائك الألومنيوم مع المنجنيز في صناعة المشروبات الغازية

ج/ لمقاومتها التآكل.

يستخدم النيكل في طلاء الكثير من المعادن

ج/ لحمايتها من الصدأ والتآكسد ويعطي شكلا أفضل.

تستخدم سبائك النيكل مع الكروم في صناعة ملفات التسخين والافران الكهربائية

ج/ لأنها تقاوم التآكل حتي وهي مسخنة لدرجة الاحمرار

يستخدم النحاس في صناعة الكابلات الكهربائية

ج/ لأنه جيد التوصيل للكهرباء.

يشذ التركيب الالكتروني لعنصري الكروم والنحاس؛

ج/ حيث ينتقل إلكترون من (4s) إلى (3d) حتى يكون (3d) نصف ممتلئ في الكروم وتام الامتلاء في النحاس ويكون (s) نصف ممتلئ وبذلك تكون الذرة أكثر استقرارا

يسهل أكسدة Fe^{2+} إلى Fe^{3+} ؟

ج/ لأنه يتحول من أقل استقرارا الي أكثر استقرارا حيث يكون المستوي الفرعي 3d نصف ممتلئ في حالة الحديد الثلاثي Fe^{3+} وهذا يجعله أكثر استقرارا .

يصعب أكسدة Mn^{2+} إلى Mn^{3+} ؟ اعداد :د محمد رزق

ج/ لأنه يتحول من أكثر استقرارا المستوي الفرعي نصف ممتلئ 3d الي أقل استقرارا .

تتميز العناصر الانتقالية بتعدد حالات تأكسدها ؛ طاقة التايين للعناصر الانتقالية تزداد بتدرج واضح ؟

ج/ لان الإلكترون المفقود يخرج من المستوي البعيد 4s اولاً ثم الاقرب 3d بالتتابع .

لا يمكن الحصول علي Na^{+2} ، Mg^{+3} ، Al^{+4} بالتفاعل الكيميائي العادي ؟

ج/ لان الزيادة في جهد التايين الثاني للصدوديوم والثالث في الماغنسيوم

والرابع في الألومنيوم كبيرة جدا لأنه يتسبب في كسر مستوي طاقة مكتمل .

السكانديوم العنصر الوحيد الذي يعطي عدد تأكسد (+3) ؟

ج/ لأن في هذه الحالة يكون (3d⁰) فارغا تماما من الإلكترونات فيكون أكثر استقرارا.

يصعب الحصول علي ايون السكانديوم Sc^{+4} ؟

ج/ لأنه يتسبب في كسر مستوي طاقة مكتمل .

تعتبر عناصر العملة (1B) (نحاس ، فضة ، ذهب) عناصر انتقالية ؟

ج/ لأن المستوي الفرعي d للعناصر الثلاثة ممتلئ بالإلكترونات في الحالة الذرية ولكن عندما تكون

حاله التأكسد (+2 ، +3) يكون المستوي الفرعي d غير ممتلئ (d⁹) (d⁸) اذن فهي عناصر انتقالية

لا تعتبر عناصر (2B) (الخارصين والكاديوم والزنك) عناصر انتقالية ؟

ج/ لا المستوي الفرعي (d¹⁰) تام الامتلاء سواء في الحالة الذرية او حالات تأكسدة +2

يشذ النيكل في التدرج في الكتلة الذرية عن باقي عناصر السلسلة الانتقالية ؟

ج/ لوجود خمس نظائر مستقرة المتوسط الحسابي لها 58.7 U .

ارتفاع درجة الانصهار والغليان لعناصر السلسلة الانتقالية ؟

ج/ بسبب الترابط القوي بين الذرات نتيجة اشتراك الكترونات 4s مع 3d .

معظم عناصر السلسلة الانتقالية الاولى ذات الكثافة العالية ؟

ج/ لان الحجم الذري ثابت تقريبا والكثافة = كتلة ذرية ÷ الحجم وبذلك يكون العامل المؤثر

علي الكثافة هو زيادة الكتلة الذرية

يستخدم عناصر السلسلة الانتقالية الاولى في صناعة السبائك ؟

ج/ بسبب الثبات النسبي في أنصاف أقطارها .

الثبات النسبي لنصف القطر من الكروم الي نحاس في العناصر الانتقالية الاولى ؟

ج/ يرجع ذلك الي عاملين متعاكسين :-

العامل الاول هو زيادة الشحنة الفعالة للنواة فيزداد قوة جذب النواة للإلكترون فيقل نصف القطر

العامل الثاني هو تزايد عدد الكترونات المستوي الفرعي 3d فيزداد قوة التنافر بينهما ويزداد نصف القطر .

الخاصية البارامغناطيسية تظهر في الايونات او الذرات التي يكون فيها اوربتالات تشغلها الكترونات مفردة ؟

ج/ حتي ينشأ عن غزل (دوران) الإلكترون المفرد حول محوره مجال

مغناطيسي يتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي.

الخاصية الدايامغناطيسية تنشأ عندما تكون جميع الالكترونات في d في حالة ازدواج والعزم يساوي صفر؟

ج/ لان كل الكترونين مزدوجين يعملان في اتجاهين متضادين

تتميز ايونات او ذرات العناصر الانتقالية بانها ملونة. وضح؟

ج/ لان لون المادة ينتج من امتصاص بعض فوتونات (طاقات) منطقة الضوء المرئي والذي تراه العين هو محصلة مخلوط الالوان المتبقية.

مركبات الكروم (III) تظهر لونها باللون الأخضر؟

ج/ لانها تمتص اللون الاحمر وتظهر باللون المتم لها وهو اللون الأخضر.

بعض ايونات العناصر الانتقالية غير ملونة ؟

ج/ لان المستوي الفرعي d قد يكون فارغ او تام الامتلاء.

معظم مركبات العناصر الانتقالية ومحاليلها ملونة ؟

ج/ لوجود الكترونات مفردة في المستوي الفرعي d امتلاء جزئي من (١:٩) الكترون.

ايونات Cu^{+1} عديم اللون بينما ايونات Cu^{+2} ازرق اللون ؟

ج/ لان ايونات Cu^{+1} جميع اوربيالات المستوي d تامة الامتلاء فتكون عديمة اللون $[18Ar] 4s^0 3d^{10}$ ،

بينما ايونات Cu^{+2} تحتوي في المستوي d علي الكترون مفرد $[18Ar] 4s^0 3d^9$ فتمتص اللون

البرتقالي وتعكس اللون الازرق اعداد : الدكتور محمد رزق

لا يمكن استخدام الخام الناعم في الافران العالية مباشرة ؟

ج/ لصغر احجامها التي لا تناسب عملية الاختزال

الحديد النقي ليس له اهمية صناعية ؟

ج/ لان الحديد النقي لين نسبيا وليس شديد الصلابة.

تفاعل الكلور مع الحديد يتكون كلوريد حديد III

ج/ لان الكلور عامل مؤكسد .

يذوب الحديد في الاحماض المخففة ليعطي املاح حديد II وليس III

ج/ لان الهيدروجين الناتج عامل مختزل .

عند بتسخين اوكسالات الحديد (II) يتكون اكسيد حديد (II) ولا يتكون (III)

ج / لأن أول أكسيد الكربون عامل مختزل.

علل لما يأتي الباب الثاني

عدد جزيئات ٣٢ جم من الأكسجين = عدد جزيئات ٢ جم من الهيدروجين ؟؟

ج/ لأن ٣٢ جرام من الأكسجين = ١ مول منه ، و ٢ جم من الهيدروجين = ١ مول منه المول من أى مادة

يحتوى على عدد ثابت من الجزيئات أو الذرات أو الأيونات ويساوى 6.02×10^{23}

الحجم الذي يشغله ٣٢ جم من غاز الأكسجين = الحجم الذي يشغله ٢ جم من غاز الهيدروجين ؟

ج/ لأن ٣٢ جرام من الأكسجين = ١ مول منه ، و ٢ جم من الهيدروجين = ١ مول منه والمول من أى غاز

يشغل حجما ثابتا وقدره ٢٢,٤ لترا .

لا يستخدم دليل الفينولفثالين في الكشف عن الاحماض ؟؟

لأنه عديم اللون في الوسط الحمضي .

كثافة غاز ثاني اكسيد الكربون اكبر من كثافة غاز الأكسجين ؟؟

المراجعة النهائية ٣ ث

١٦

ت/ ٠١٠٠٨٨٤٦٦٣١

لأن الكتلة الجزيئية لغاز ثاني أكسيد الكربون أكبر من الكتلة الجزيئية لغاز الأكسجين .
لا يستخدم محلول قاعدي في التمييز بين دليل عباد الشمس ودليل الأزرق بروموثيمول ؟؟
لأن لونهما أزرق في الوسط القاعدي .

يستخدم ورق ترشيح عديم الرماد عند إجراء التحليل الكمي الوزني بطريقة الترسيب ؟؟
لأنه يحترق احتراقاً تاماً ولا تترك أي رماد

أهمية التحليل الكيميائي في مجال الطب ؟

ج / لأنها تستخدم في مجال الطب في تقدير كمية المادة الفعالة في الدواء وتشخيص الأمراض
وتقدير نسبة السكر والزرال والبولينا والكوليسترول

أهمية التحليل الكيميائي في الصناعة ؟ اعداد : د محمد رزق

ج / لأنها في مجال الصناعة تحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية .

أهمية التحليل الكيميائي في مجال الزراعة ؟

ج / لأنها تعمل على تحسين خواص التربة والمحاصيل معالجتها بالأسمدة المناسبة .

يفضل التسخين الهين عند إجراء الكشف عن أيونات المجموعة الأولى ؟

ج : لأن التسخين الهين يساعد على طرد الغازات . اعداد : د محمد رزق

الكشف عن الشقوق القاعدية أكثر تعقيداً من الكشف عن الشقوق الحامضية ؟

ج : بسبب كثرة الشقوق القاعدية والتداخل فيما بينها بالإضافة إلى إمكانية وجود الشق
الواحد في أكثر من حالة تأكسد مثل الحديد $2+$ والحديد $3+$.

ترسب فلزات المجموعة التحليلية الأولى على هيئة كلوريدات ؟ علل

ج / لأنه بإضافه كاشف المجموعة حمض الهيدروكلوريك المخفف يتكون كلوريدات فلزات
المجموعة التحليلية الأولى وهي شحيحة الذوبان في الماء مثل كلوريد الفضة (I) وكلوريد
الرصاص (II) وكلوريد الزئبق (I)

علل لها يأتي الباب الثالث

تفاعل نترات الفضة مع كلوريد الصوديوم تفاعل تام ؟؟

ج : لخروج أحد النواتج من حيز التفاعل على هيئة راسب أبيض من كلوريد الفضة .

تفاعل الماغنسيوم مع حمض الهيدروكلوريك تفاعل تام ؟؟

ج : لخروج أحد النواتج من حيز التفاعل على هيئة غاز الهيدروجين .

تفاعل حمض الأسيتيك مع الكحول الإيثيلي تفاعل إنعكاسي ؟؟

ج : لأنه يسير في الاتجاهين الطردى والعكسي وجميع المواد المتفاعلة والناجمة موجودة باستمرار في حيز التفاعل
تضاف قطرات من حمض الكبريتيك المركز إلى هذا التفاعل ؟؟

ج : لإمتصاص الماء ومنع حدوث التفاعل العكسي .

الإتزان الكيميائي عملية ديناميكية وليست ساكنة ؟؟

ج : لأنه بالرغم من تساوي معدل التفاعل الطردى مع العكسي إلا أن حدوث التفاعل مستمرا في كلا الاتجاهين

المركبات الأيونية تفاعلاتها سريعة ؟؟

ج : لأن التفاعل يتم بين أيونات المواد المتفاعلة بمجرد خلطها .

المركبات التساهمية تفاعلاتها بطيئة ؟؟ أو المركبات العضوية تفاعلاتها بطيئة ؟؟

ج : تفاعلاتها بطيئة عادة مثل المركبات العضوية لأن التفاعل يتم بين الجزيئات غير المتأينة .

تفاعل حجم معين من حمض الهيدروكلوريك المخفف مع مسحوق الخارصين أسرع من تفاعله مع قطعة واحدة من الخارصين لها نفس الكتلة؟؟

ج : لأن مساحة السطح في حالة مسحوق الخارصين أكبر ، وكلما زادت مساحة السطح زادت سرعة التفاعل يفضل استخدام النيكل المجزأ عن قطع النيكل في درجة الزيوت

ج : لأن مساحة السطح في حالة النيكل المجزأ أكبر ، وكلما زادت مساحة السطح زادت سرعة التفاعل .

تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع قطعة ماغنسيوم أبطأ من تفاعله مع مسحوق الماغنسيوم؟؟

ج : لأن مساحة السطح في حالة مسحوق الماغنسيوم أكبر ، وكلما زادت مساحة السطح زادت سرعة التفاعل

زيادة درجة الحرارة تؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي؟؟

ج : لأن زيادة درجة الحرارة تؤدي إلى زيادة عدد الجزيئات المنشطة وبالتالي يزيد معدل التفاعل الكيميائي .

جزيئات المتفاعلات ذات السرعات العالية جدا هي التي تتفاعل فقط؟؟

ج : لأن طاقتها الحركية العالية تمكنها من كسر الروابط بين الجزيئات فيحدث التفاعل الكيميائي .

تتم صناعة غاز النشادر تحت تبريد وضغط مرتفع؟؟

ج : $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$, $\Delta H = (-92 \text{ K.J})$ لأنه عند زيادة الضغط أو التبريد على

تفاعل غازي متزن ينشط التفاعل في الاتجاه الذي يقل فيه الحجم ويزداد معدل تكون غاز النشادر .

لا تتم صناعة غاز أكسيد النيتريك تحت ضغط مرتفع مثل غاز النشادر؟؟

ج : $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$

لتساوي عدد المولات (الحجم) على جانبي المعادلة وبالتالي لا يؤثر الضغط بالزيادة أو النقصان .

تستخدم أواني الضغط (البريستو) في طهي الطعام؟؟

ج : لأنها ترفع درجة الحرارة في وقت قصير فتسرع التفاعل فيتم طهي الطعام بسرعة .

صعوبة ذوبان كلوريد الفضة تبعاً للمعادلة :

$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$, $K_c = 1.7 \times 10^{-10}$

ج : لأن قيمة ثابت الإتزان اقل من الواحد مما يدل على ان التفاعل العكسي هو السائد .

صعوبة انحلال كلوريد الهيدروجين تبعاً للمعادلة

$H_2 + Cl_2 \rightleftharpoons 2HCl$, $K_c = 4.4 \times 10^9$

ج : لأن قيمة ثابت الإتزان كبيرة مما يدل على ان التفاعل الطردى هو السائد .

ينصح بعدم تسخين إسطوانات الغاز للحصول الغاز؟؟

ج : لأن رفع درجة الحرارة يزيد من الضغط داخل إسطوانة الغاز فتفجر الإسطوانة .

يزول لون غاز ثاني أكسيد النيتروجين عند تبريده؟؟

ج : لأن التفاعل طارد للحرارة وعند امتصاص الحرارة من تفاعل متزن طارد للحرارة يسير التفاعل في

الاتجاه الطردى . $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4 + \text{Heat}$

لا يكتب تركيز الماء او المواد الصلبة في معادلات حساب ثابت الإتزان؟؟

ج : لأن تركيزها ثابت مهما اختلفت كميتها .

محلول كلوريد الهيدروجين ومحلول حمض الخليك في البنزين لا يوصل التيار الكهربى؟؟

ج : لعدم وجود أيونات حرة لأنهما يذوبان في البنزين دون حدوث تأين .

تزيد درجة تأين حمض الخليك في الماء بالتخفيف؟؟

ج : $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$ لأنه إلكتروليت ضعيف التأين في

الماء و كلما زاد التخفيف (تركيز الماء) يسير التفاعل في الاتجاه الطردى حسب قاعدة لوشاتلييه و

يزيد تركيز الأيونات المفككة فيزيد توصيله للتيار الكهربى .

لا يتأثر محلول كلوريد الهيدروجين في الماء بالتخفيف؟؟

ج : لأنه تام التأين في الماء .

يستدل على قوة الحمض من ثابت تأينه؟؟

ج : لأن قوة الحمض تتناسب طردياً مع قيمة ثابت التأين .

لا يوجد أيون الهيدروجين الناتج من تأين الأحماض في محاليلها المائية منفرداً؟؟

ج : لأنه ينجذب إلى زوج الإلكترونات الحر الموجود على ذرة الأكسجين ويرتبط مع جزيء الماء برابطة تناسقية .

لا ينطبق قانون فعل الكتلة على محاليل الإلكتروليتات القوية؟؟

ج : لأن محاليلها لا تحتوي على جزيئات غير متأينة حيث أنها تامة التأين .

يمكن تطبيق قانون فعل الكتلة على محاليل الإلكتروليتات الضعيفة فقط؟؟

ج : لأن محاليلها تحتوي باستمرار على حالة من الإتزان بين الجزيئات غير المفككة والأيونات

الماء متعادل التأثير على عباد الشمس؟؟

ج : لأن تركيز أيون الهيدروجين يساوي تركيز أيون الهيدروكسيل يساوي ١٠^{-٧}

علل لما يأتي الباب الرابع

أهمية الطاقة الكهربائية؟؟

ج : لأنها صديقة للبيئة ولا تلوثها .

أهمية القنطرة الملحية؟؟

ج / تقوم بالتوصيل بين محلولي نصفى الخلية وتمنع الإتصال المباشر بين المحلولين . كما تقوم بمعادلة الشحنات الموجبة والسالبة التي تتكون في محلولي نصف الخلية . كما تكون فرق جهد بين محلولي نصف الخلية

الأنود هو القطب السالب في الخلية الجلفانية؟

ج : لأنه مصدر للإلكترونات وتحدث عنده عملية أكسدة

قد يتغير جهد قطب الهيدروجين القياسي أحيانا عن الصفر؟؟

ج : بسبب تغير تركيز أيون الهيدروجين في المحلول أو تغير الضغط الجزئي للغاز أو تغير كلاهما

يمكن من قيمة القوة الدافعة الكهربائية التعرف على نوع الخلية تحليلية أو جلفانية؟

ج : لأنه إذا كانت ق.د.ك. سلطان موجبة كانت الخلية جلفانية لأنها تنتج تيار كهربياً . سلطان سالبة كانت الخلية تحليلية تحتاج إلى مصدر خارجي للتيار الكهربى .

العناصر المتقدمة في سلسلة الجهود الكهربائية للعناصر عوامل مختلطة قوية؟؟

ج : لأنها فلزات تتأكسد وتفقد الإلكترونات بسهولة .

العناصر في نهاية سلسلة الجهود الكهربائية للعناصر عوامل مؤكسدة قوية؟؟

ج : لأنها لافلزات تختزل بسهولة وذات قدرة أكبر على إكتساب الإلكترونات .

الخارصين يحل محل النحاس في محاليل أحد أملاحه بينما لا يحدث العكس؟؟

ج : لأن الخارصين يسبق النحاس في متسلسلة الجهود الكهربائية للعناصر .

لا تحفظ نترات الفضة في أواني من النحاس؟؟

ج : لأن النحاس يسبق الفضة في متسلسلة الجهود الكهربائية فيحل محله ويتأككل الإناء .

تزداد قدره عنصر الصوديوم على الإحلال محل هيدروجين حمض الهيدروكلوريك عن قدرة

الألومنيوم؟؟

ج : لأن الصوديوم يسبق الألومنيوم في سلسلة الجهود الكهربائية وكلما زاد البعد في الترتيب بين العنصرين كلما زادت قدرة العنصر المتقدم على الإحلال .

عند تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف يتصاعد غاز الهيدروجين ؟؟

ج : لأن الحديد يسبق الهيدروجين في سلسلة الجهود الكهربائية فيحل محله ويتصاعد غاز الهيدروجين .

يفضل استخدام عنصر الليثيوم في صناعة بطارية أيون الليثيوم ؟

ج : اخف فلز معروف و جهد اختزاله القياسي هو الاصغر بالنسبة لباقي الفلزات الاخرى

تستخدم بطارية أيون الليثيوم كبديل لبطارية السيارة (المركم الرصاصي) ؟

ج/لخفة وزنها وقدرتها على تخزين كميات كبيرة من الطاقة بالنسبة لحجمها

الالكتروليت في خلية الليثيوم لابد ان تكون لامائي ؟

ج : لأن الليثيوم يتفاعل مع الماء بشدة وتنطلق حرارة قد تؤدي الى انفجار الخلية .

اهمية خلايا الوقود في مركبات الفضاء

ج : يرجع ذلك الى :

✓ لأن الوقود الغازي من الهيدروجين والاكسجين المستخدم في اطلاق الصواريخ هو نفسة الوقود المستخدم في هذه الخلايا .

✓ تعمل خلية الوقود عند درجة حرارة عالية فيتبخر الماء الناتج منها ويمكن اعادة تكثيفه للاستفادة منه كمياه للشرب لرواد الفضاء .

خلية الوقود لا تستهلك كباقي الخلايا الجلفانية

ج : لأنها تزود بالوقود من مصدر خارجي .

خلية الوقود عكس الخلايا الاخرى

ج : لأنها لا تختزن الطاقة لأن عملها يتطلب امدادها المستمر بالوقود وازالة مستمرة للنواتج

يصدا الحديد المطلي بالقصدير عند الخدش اسرع من الحديد ؟

ج : لأن تأكل الفلزات النقية ومنها الحديد يكون صعبا .

يجب التخلص من خلية الزئبق بعد الإستخدام بطريقة آمنة بعيدا عن متناول الأطفال .

ج : لأنها تحتوى على الزئبق وهو مادة سامة .

نقص التيار الناتج من بطارية السيارة عند إستخدامها لفترة طويلة ؟؟

ج : لأن طول إستعمالها الى فترة طويلة يؤدي الى نقص تركيز حمض الكبريتيك فيها بسبب زيادة

تركيز الماء الناتج من التفاعل وتحول مواد الكاثود (PbO_2) و الأنود Pb الى كبريتات الرصاص (II)

وذلك يؤدي الى نقص كمية التيار الكهربى الناتج منها .

تعتبر الخلايا الثانوية (المركم) بطاريات لتخزين الطاقة ؟؟

ج : لأنه يتم فيها أحداث تفاعل كيميائي غير تلقائي بواسطة مرور تيار كهربى وهذا يعنى تخزين

الطاقة الكهربائية الواردة من المصدر الخارجى فى شكل طاقة كيميائية .

اهمية الدينامو فى السيارة ؟؟

ج : يستخدم الدينامو فى السيارة وبصورة مستمرة فى إعادة شحن البطارية أولا بأول .

يجب شحن المركم من أن للأخر ؟؟

ج : لأن ذلك يؤدي الى حدوث تفاعل عكسى وتتحول كبريتات الرصاص (II) الى رصاص عند الأنود

وثانى أكسيد الرصاص عند المهبط كما يعيد تركيز الحمض الى ما كان عليه .

المركم الرصاص يعتبر خلية انعكاسية ؟؟

ج : لأنه عند توصيل قطبي البطارية بمصدر للتيار الكهربى المستمر له جهد أكبر قليلا من جهد البطارية ، يؤدي إلى حدوث تفاعل عكسى وتتحول كبريتات الرصاص (II) إلى رصاص عند الأنود وثانى أكسيد الرصاص عند المهبط كما يعيد تركيز الحمض إلى ما كان عليه .

الجهد الكلى لبطارية السيارة ١٢ فولت بالرغم من أن خلية الرصاص الحامضية لها جهد ٢ فولت ؟

ج : لأن هذه البطارية مكونة من ٦ خلايا متصلة معا على التوالى ، وكل خلية تنتج ٢ فولت فيكون الجهد الكلى للخلية ١٢ فولت (١٢ = ٦ × ٢)

يمكن الحصول على غاز الكلور بالتحليل الكهربى للمحاليل المائية التى تحتوى على أيون الكلوريد ؟

ج : لأن جهد أكسدة الكلور أعلى من جهد أكسدة الماء فيحدث للكلور أكسدة عند الأنود .

يصعب الحصول على الصوديوم بالتحليل الكهربى للمحاليل المائية التى تحتوى على أيون الصوديوم

ج : لأن جهد اختزال الصوديوم أقل من جهد اختزال الماء فيصعب اختزال الصوديوم ويظل ذائب فى الماء لا يمكن قياس جهد قطب منفردا ؟؟

ج : لأنه يمثل نصف خلية .

لا يستخدم النحاس نقاوه ٩٩ ٪ فى صناعة الأسلاك الكهربائية ؟؟

ج : لأنه يحتوى على شوائب الخارصين والحديد والفضة والذهب التى تقلل من التوصيل الكهربى للنحاس


يمكن التعرف على حالة المركب الرصاصى من كثافة الحمض ؟؟

ج : لأن البطارية تكون تامة الشحن إذا كانت كثافة الحمض بين (١,٢٨ الى ١,٣ جم / سم ٣) ويعاد شحن البطارية إذا قلت كثافة الحمض الى أقل من ١,٢ جم / سم ٣ .

علل لما يأتى الباب الخامس

(١) **تجربة فوهرل هدمت نظرية القوة الحيوية.**

• لأن العالم فوهرل استطاع تحضير مركب عضوي من مركبين غير عضوين وهما سيانات الفضة وكلوريد الأمونيوم بالتسخين الشديد للحصول على اليوريا مادة عضوية فى البول.



(٢) **كثرة وانتشار المركبات العضوية.**

• لقدرة ذرات الكربون على الارتباط ببعضها وبذرات أخرى بروابط أحادية وثنائية وثلاثية وسلاسل مستمرة ومتفرعة وحلقية متجانسة وغير متجانسة.

(٣) **لا تكفى الصيغة الجزيئية لتعبر عن المركب العضوى ؟**

• لأن الصيغة الجزيئية توضح عدد الذرات ونوعها فقط ولا توضح ترتيب الذرات ونوع روابطها.

(٤) **الألكينات انشط كيميائياً من الألكانات ؟**

• لأن الألكانات مركبات مشبعة بروابط أحادية من النوع سيجمما القوية صعبة الكسر بينما الألكينات تحتوى على رابطة سيجمما وأخرى باى سهلة الكسر.

(٥) **غاز الميثان يسمى بغاز المستنقعات ؟**

• لأن غاز الميثان ينتج من التحلل اللاهوائى للفضلات الحيوية بواسطة بكتريا لاهوائية ويحدث فى المستنقعات .

(٦) **يفضل الجير الصودي عن الصودا الكاوية عند تحضير الميثان ؟**

• لأن الجير الصودي يحتوى على خليط من الصودا الكاوية والجير الحى الذى يعمل على خفض درجة الانصهار وعامل حفاز .

(٧) تغطي الفلزات بالألكانات الثقيلة ؟

• لأن الألكانات غير نشطة كيميائية ولا تتفاعل مع التغيرات الجوية فلا يحدث صدأ للمعادن.

(٨) لا يستخدم الكلوروفورم حالياً كمخدر ؟

• لأن الجرعات الغير مقدرة تقديراً دقيقاً قد تسبب الوفاة .

(٩) تستخدم الفريونات بكميات كبيرة على نطاق واسع ؟

• لأنها رخيصة الثمن - لا تشتعل - غير سامة - لا تعمل على تآكل المعادن وسهولة إصالتها.


(١٠) سيحرم استخدام الفريونات بداية من سنة ٢٠٢٠ ؟

• لأنها تسبب تآكل طبقة الأوزون التي تقي الأرض من أخطار الأشعة فوق البنفسجية .

(١١) الألكانات أو الألكينات أو الألكاينات سلاسل متجانسة ؟


• لأن كلا منها له قانون عام واحد وتتشابه في الخواص الكيميائية وتدرج في الخواص الفيزيائية وبين المركب والذي يليه CH_2

(١٢) لا يسمى المركب المركب الاتي ب ٢ إيثيل بروبان <.....



• لأن السلسلة المستمرة الطويلة ٤ ذرات كربون ولذلك يسمى ٢ - ميثيل بيوتان.

(١٣) عند رج الإيثين مع البروم المذاب في رابع كلوريد الكربون يزول لون البروم الأحمر ؟



• لأنه يتكون مركب جديد ١ ، ٢ ثنائي بروموإيثان عديم اللون

(١٤) عند إضافة بروميد الهيدروجين إلى البر وبين لا يتكون ١ - بروموبروبان ؟

• لأنه تبعاً لقاعدة ماركونيكوف فإن ذره البروم ترتبط بذره الكربون الأقل هيدروجيناً ويتكون

٢ - بروموبروبان $CH_3 - CHBr - CH_3$ (تكتب المعادلة)

(١٥) الهيدرة الخفريه للإيثيلين تتم في وسط حمضي ؟

• لأن الماء إلكتروليت ضعيف فإن تركيز أيون الهيدروجين الموجب يكون ضعيفاً لا يستطيع كسر الرابطة المزدوجة لذا لا يتم التفاعل إلا في وسط حمضي .

(١٦) الإيثيلين جليكول مادة مانعة لتجمد مياه مبردات السيارات في المناطق الباردة ؟

• لأنه يكون روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء فيمنع تجمع جزيئات الماء مع بعضها على هيئة بلورات ثلج .

(١٧) يستخدم التفلون في تبطين أواني الطهي ؟

• لأنه يتحمل الحرارة ولا يلتصق.

(١٨) الألكينات تتفاعل بالإضافة على مرحلة واحدة بينما الألكاينات تتفاعل بالإضافة على مرحلتين ؟

• لأن الألكينات تحتوي على رابطة واحدة باي بينما الألكاينات تحتوي على رابطتين باي

(١٩) يمرر غاز الإيثاين على محلول كبريتات النحاس في حمض كبريتيك مخفف بعد تحضيره ؟

• لإزالة غاز الفوسفين PH_3 وغاز كبريتيد الهيدروجين H_2S الناتجين من الشوائب الموجودة في كربيد الكالسيوم.

(٢٠) يستخدم لهب الأكسي استلين في لحام وقطع المعادن ؟

• لأنه تفاعل طارد للحرارة وتبلغ الحرارة المنطلقة حوالي ٣٠٠٠ م فيستخدم في لحام وقطع المعادن

(٢١) لا يستخدم محلول البروم في رابع كلوريد الكربون للتمييز بين الإيثين والإيثاين ؟

• لأن كل من الإيثاين والإيثين مركبات غير مشبعة ويزول لون البروم مع كل منهما .

(٢٢) البروبان الحلقي انشط من البروبان العادي ؟

• لأن الزوايا في البروبان الحلقي (٦٠°) وتؤدي هذه الزوايا إلى تداخل ضعيف بين الأوربيتالات الذرية ويكون الارتباط بين ذرات الكربون ضعيفة ولذلك نجد أنها نشطة .

(٢٣) البناتان الحلقى والهكسان الحلقى مستقران وثابتان ؟

• لأن الزوايا بين الروابط تقترب من 109° وبالتالي يكون الارتباط بين الأوربيتالات قوياً وتتكون روابط سيجما.

(٢٤) هلجنة الطولوين ينتج عنه مركبين بينما هلجنة النيتروبنزين ينتج عنها مركب واحد ؟

• لأن مجموعة الألكيل في الطولوين توجهه إلى موقعين بارا وارثو بينما مجموعة النيترو توجهه إلى موقع واحد وهو موقع ميتا .

(٢٥) يستخدم د.د.ت كمبيد حشري ؟

• لأن الجزء ($CH-CCl_3$) من الجزء يذوب في النسيج الدهني للحشرة فيقتلها .

(٢٦) وصف د.د.ت بأنه اقبح مركب حضر في تاريخ الكيمياء ؟

• لأنه مركب شديد السمية على جميع الحشرات وهو مركب ثابت مما يضمن استمرار فاعليته لمدة طويلة دون الحاجة لتكرار رشه وسبب مشاكل بيئية فبقائه في البيئة دون تحلل قتل الحشرات النافعة مثل النحل وتسرب في مياه الأنهار وقتل الأسماك والكائنات البحرية أى تسرب إلى السلسلة الغذائية حتى وصل للإنسان

(٢٧) تستخدم مركبات عديد كلورو ثنائي الفينيل كمواد عازلة للحريق ؟

• لأنها تتميز بثباتها الشديد حتى 800° م وخمولها الكيميائي.

(٢٨) حرمت الولايات المتحدة عام ١٩٧٩ استخدام مركبات عديد كلورو ثنائي الفينيل ؟

• لأن لها تأثير على صحة الإنسان في تورم المفاصل واختلال وظائف الكبد ألام العيون والسمع وتشوه المواليد

(٢٩) $T.N.T$ مادة شديدة الانفجار (مركبات عديدة النيترو العضوية).

• لأنها تحتوي على وقودها الذاتي وهو الكربون أما الأكسجين فهو المادة المؤكسدة وهي تحترق بسرعة وينتج كمية كبيرة من الحرارة والغازات ويحدث انفجار وذلك لضعف الرابطة بين ($N-O$) ، ($C-N$) ويتكون رابطتين قويتين ($C-O$) ، ($N-N$)

(٣٠) الألكانات مركبات مشبعة بينما الألكينات مركبات غير مشبعة ؟

• لأن الألكانات ترتبط بروابط أحادية بينما الألكينات تحتوي على روابط ثنائية منها روابط π باي سهلة الكسر.

(٣١) لا يتكون ١ ، ٢ ثنائي برومو ايثان عند إضافة بروميد الهيدروجين إلى بروميد الفينيل ؟

• لأن ذرة الهيدروجين ترتبط بذرة الكربون الأكثر هيدروجيناً وعلى ذلك يتكون ١ ، ١ ثنائي برومو ايثان. تبعاً لقاعدة ماركونيكوف (تكتب المعادلة)

(٣٢) يزول لون برمنجانات البوتاسيوم القلوي المخفف عند امرار غاز الإيثين فيه ؟

• لتكوين إيثيلين جليكول عديم اللون وهذا دليل على وجود الرابطة المزدوجة.

(٣٣) الإيثانول وثنائي ميثيل إثير متشاكلين جزئيين ؟

• لأن الصيغة الجزيئية لها واحدة (C_2H_6O) ولكنهما مختلفان في الصيغة البنائية والخواص

(٣٤) تتميز المركبات العضوية بعدم قدرتها على توصيل الكهرباء ؟

• لأنها مركبات تساهمية لا تتأين .

(٣٥) ١ - بيوتين الكين غير متماثل بينما ٢ - بيوتين الكين متماثل ؟

• لأن ذرتي الكربون ذات الرابطة الثنائية في ١ - بيوتين غير متساوية في عدد ذرات الهيدروجين CH_3-CH_2- أما ٢ - بيوتين فذرتي الكربون ذات عدد متساوي من الهيدروجين $CH_3-CH=CH-CH_3$

(٣٦) المنظفات الصناعية تزيل البقع والقاذورات ؟

• لأنه عندما يذوب المنظف في الماء فإن جزيئاته ترتب نفسها بحيث أن الذيل الكاره للماء من كل جزيء يتجه ناحية القاذورات وبالنسج ويلتصق بها أما الرأس الشره للماء يتجه ناحية الماء ويلتف الجزيء حول القاذورات ويحيط بها، وعند الاحتكاك الميكانيكي تبدأ عملية التنظيف حيث أن الشحنات المتشابهة تتنافر.

(٣٧) الكحول الإيثيلي يعتبر من البتروكيماويات ؟

• لأنه يحضر من الإيثيلين الناتج من التكسير الحفزي للمواد البترولية الثقيلة (تكتب المعادلات)

(٣٨) درجة غليان الكحولات أعلى من درجة غليان الألكانات المقابلة ؟

• لوجود مجموعة الهيدروكسيد بالكحولات التي تعمل على تكوين روابط هيدروجينية .

(٣٩) الكحول الايثيلي رغم انه مركب تساهمي إلا أنه يذوب في الماء ؟

• وجود مجموعته الهيدروكسيل التي تكون مركبات هيدروجينية مع الماء فيسبب ذوبانها.

(٤٠) الكحولات تظهر لها حمضية ضعيفة ؟

• يظهر ذلك من تفاعلها مع الفلزات القوية مثل الصوديوم والبوتاسيوم ويرجع ذلك إلى أن زوج الإلكترون الذي يربط بين الهيدروجين والأكسجين يميل إلى الأكسجين الأكثر سالبية كهربية وبذلك يسهل كسر هذه الرابطة ويحل الفلز محل هيدروجين مجموعته الهيدروكسيل

(٤١) تضاف قطرات من حمض الكبريتيك إلى تفاعل تكوين الأستر ؟

• لمنع التفاعل العكسي وتكوين الأستر .

(٤٢) الكحولات الأولية تتأكسد على مرحلتين بينما الكحولات الثانوية تتأكسد على مرحلة واحدة ؟

• لأن الكحولات الأولية يوجد ذرتين هيدروجين مرتبطتين بمجموعته الكربونيل فتتأكسد كل منها تلي الأخرى بينما الكحولات الثانوية يوجد ذرة هيدروجين واحدة مرتبطة بمجموعته الكربونيل.

(٤٣) الكحولات الثلاثية صعبة الأكسدة في الظروف العادية ؟

• لأنه لا يوجد بهل ذرات هيدروجين مرتبطة بمجموعته الكربونيل .

(٤٤) يستخدم الكحول الايثيلي في صناعة ترمومترات قياس درجات الحرارة المنخفضة إلى - ٥٠ م ؟

• لأن درجة تجمده منخفضة (- ١١٠.٥ م).

(٤٥) درجة غليان الجلسرول اعلى من الايثلين جليكول ؟

• لوجود ثلاث مجموعات هيدروكسيد في الجلسرول وكلما زادت مجموعات الهيدروكسيد كلما ارتفع درجة الغليان لزيادة عدد الروابط الهيدروجينية المتكونة.

(٤٦) حامضية الفينول اكبر من حامضية الكحول ؟

• لأن مجموعة الأريل ساحبة للإلكترونات مما يجعل الرابطة بينها وبين الأكسجين قصيرة ورابطة الهيدروجين والأكسجين طويلة سهلة الكسر بينما مجموعته الألكيل طاردة للإلكترونات فتزيد الشحنة السالبة على الأكسجين فتصبح الرابطة بين الأكسجين والهيدروجين قصيرة.

(٤٧) لا يتفاعل الفينول مع هاليدات الهيدروجين مثل HCl ؟

• لقوة الرابطة بين الأكسجين وحلقة البنزين وهي صعبة الكسر.

(٤٨) درجة غليان الأحماض الكربوكسيلية اعلى من درجة غليان الكحولات المقابلة ؟

• لأن يكون مع جزيئات الحمض رابطتين هيدروجينيتين بينما في الكحول رابطة هيدروجينية واحدة .

(٤٩) يطلق على الأحماض الأليفاتية المشبعة أحادية الكربوكسيل الأحماض الدهنية ؟

• لأن كثير من الأحماض الأليفاتية يدخل في تركيب الدهون على هيئة استرات مع الجليسرول .

(٥٠) درجة غليان الأسترات اقل من الكحولات ؟


• لأن الأسترات لا تحتوي على مجموعة هيدروكسيل فلا تكون روابط هيدروجينية بينما الكحولات تحتوي على مجموعة هيدروكسيل فتكون روابط هيدروجينية.

(٥١) ينصح بتفتيت حبة الأسبرين قبل بلعها ؟


• حتى لا تسبب تهيجا لجدار المعدة الذي قد يؤدي إلى قرحة المعدة .

(٥٢) حمض البنزويك أحادي القاعدية بينما حمض الفيثاليك ثنائي القاعدة ؟

• لأن حمض البنزويك يحتوي على مجموعة كربوكسيل واحدة بينما حمض الفيثاليك يحتوي على مجموعتين كربوكسيل.



فيثاليك



بنزويك

(٥٣) الأحماض الأمينية الموجودة في البروتينات من النوع ألفا أمينو ؟

• لأن مجموعة الأمين ترتبط بأول ذرة كربون متصلة بمجموعة الكربوكسيل

السؤال السادس : قارن بين كلا من

مقارنة	طريقة الصهر	طريقة الترسيب الكهربائي
طريقة التحضير	عن طريق صهر الفلزات مع بعضها وترك المنصهر ليبرد تدريجيا	عن طريق الترسيب الكهربائي لفلزين او اكثر في نفس الوقت
مثال	(حديد وفانديوم) (حديد وكروم) (حديد ومنجنيز) (حديد ونيكل)	تغطية المقابض الحديدية بالنحاس الاصفر (نحاس وخارصين) وذلك بترسيبه كهربيا من محلول يحتوي ايونات النحاس والخارصين علي هذه المقابض

وجه المقارنة	الفرن العالي	فرن مدر كس
العامل المختزل	غاز اول اكسيد الكربون	خليط من غازي اول اكسيد الكربون والهيدروجين (الغاز المائي)
تحضير العامل المختزل	ينتج من فحم الكوك $C + O_2 \xrightarrow{\Delta} CO_2$ $C + CO_2 \xrightarrow{\Delta} 2CO$	ينتجان من الغاز الطبيعي (نسبة الميثان CH_4 فيه 93 %) $2CH_4 + CO_2 + H_2O \xrightarrow{\Delta} 3CO + 5H_2$
تفاعل الاختزال	$Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{\Delta} 2Fe + 3CO_2$	$2Fe_2O_3 + 3CO + 3H_2 \xrightarrow{\Delta} 4Fe + 3CO_2 + 3H_2O$

وجه المقارنة	المواد البارامغناطيسية	المواد الدايا مغناطيسية
التعريف	هي المادة التي تنجذب للمجال المغناطيسي الخارجي نتيجة وجود الالكترونات مفردة	هي المادة التي تتنافر مع المجال المغناطيسي الخارجي نتيجة لوجود جميع الالكترونات في حالة ازدواج
العزم المغناطيسي	هو عدد الإلكترونات المفردة في المستوي الفرعي (3d)	يساوي صفر
مثال	$26Fe : [18Ar] 4s^2 3d^6$ $3d \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$ العزم = ٤	$30Zn : [18Ar] 4s^2 3d^{10}$ $3d \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow$ العزم = صفر


اعداد : الدكتور محمد رزق

الدليل	اللون في الوسط الحمض	اللون في الوسط القاعدي	اللون في الوسط المتعادل
الميثيل البرتقالي	أحمر	أصفر	برتقالي
الفينولفثالين	عديم اللون	أحمر	عديم اللون
عباد الشمس	أحمر	أزرق	بنفسجي
أزرق بروموثيمول	أصفر	أزرق	أخضر

المقارنة	الخلية الوقود	خلية الزئبق	بطارية الليثيوم	المركب الرصاصي
نوع الخلية	خلية أولية	خلية أولية	خلية ثانوية	خلية ثانوية
القطب السالب (الأنود)	الهيدروجين H_2	الزئبق Zn	جرافيت الليثيوم LiC_6	شبكة من الرصاص مملوءة برصاص أسفنجي (Pb)
القطب الموجب (الكاثود)	الأكسجين O_2	أكسيد الزئبق (HgO) وجرافيت	أكسيد الليثيوم كوبلت $LiCoO_2$	شبكة من الرصاص مملوءة بعجينة من ثاني أكسيد الرصاص (PbO)
الإلكتروليت	محلول هيدروكسيد البوتاسيوم	محلول هيدروكسيد البوتاسيوم	$LiPF_6$	حمض الكبريتيك المخفف
تفاعل الأكسدة	$2H_2 + 4OH^- \rightarrow 4H_2O + 4e^-$	$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$	$LiC_6 \rightarrow C_6 + Li^+ + e^-$	$Pb + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 + 2e^-$
تفاعل الاختزال	$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$	$Hg^{2+} + 2e^- \rightarrow Hg$	$CoO_2 + Li^+ + e^- \rightarrow LiCoO_2$	$PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$
التفاعل الكلي	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$	$Zn + HgO \rightarrow ZnO + Hg$	$LiC_6 + CoO_2 \rightleftharpoons C_6 + LiCoO_2$	$Pb + PbO_2 + 4H^+ + 2SO_4^{2-} \rightleftharpoons 2PbSO_4 + 2H_2O$
الرمز الاصطلاحي		$Zn Zn^{2+} Hg^{2+} Hg$		$Pb Pb^{2+} Pb^{4+} Pb^{2+}$
ق.د.ك	1,23 فولت	1,35 فولت	3 فولت	12 فولت

تفاعلات لحظية سريعة	تفاعلات بطيئة نسبياً	تفاعلات بطيئة جداً
هي تفاعلات تحدث في فترة زمنية قصيرة .	هي تفاعلات تحدث في فترة زمنية طويلة .	هي تفاعلات تحدث في فترة زمنية طويلة جداً تأخذ عدة شهور
تتم في المركبات الايونية (عن طريق تبادل الايونات)	تتم في المركبات التساهمية (عن طريق تبادل الجزيئات)	
مثال تفاعل نترات الفضة مع كلوريد الصوديوم لتكوين راسب ابيض من كلوريد الفضة بمجرد خلط المواد المتفاعلة	مثال تفاعل التصبن و هو تفاعل الزيوت مع الصودا الكاوية لتكوين الصابون و الجلسرين	مثال تفاعل تكوين صدأ الحديد

العلاقة بين التركيز و الزمن

لتفاعل تام	لتفاعل انعكاسي
يقل تركيز المواد المتفاعلة حتى تستهلك تماماً ويزيد تركيز المواد الناتجة من التفاعل .	يقل تركيز المواد المتفاعلة ويزيد تركيز المواد الناتجة من التفاعل إلى أن يصل إلى حالة الإتزان
الشكل البياني الذي يوضح العلاقة	
	
العوامل المؤثرة في معدل (سرعة) التفاعل	العوامل المؤثرة في تفاعل متزن
١. طبيعة المواد المتفاعلة . ٢. تركيز المواد المتفاعلة . ٣. درجة حرارة التفاعل . ٤. الضغط . ٥. الضوء . ٦. العوامل الحفازة .	١. طبيعة المواد المتفاعلة . ٢. تركيز المواد المتفاعلة . ٣. درجة حرارة التفاعل . ٤. الضغط . ٥. الضوء .

الاتجاه الطردي	الاتجاه العكسي
هو اتجاه التفاعل من المتفاعلات الى النواتج	هو اتجاه التفاعل من النواتج الى المتفاعلات
يقل تركيز المتفاعلات ويزداد تركيز النواتج	يقل تركيز النواتج ويزداد تركيز المتفاعلات

المقارنة	الكحولات	الفينولات
الصفة الحمضية	صفة حمضية ضعيفة	صفة حمضية قوية
التفاعل مع الصوديوم	تفاعل	تفاعل
التفاعل مع القلويات	لا تفاعل	تفاعل
التفاعل مع الأحماض المعدنية	تفاعل	لا تفاعل

م	وجهة المقارنة	المركبات العضوية	المركبات الغير العضوية
١	التركيب	يشترط أن تحتوى على الكربون .	قد تحتوى على عناصر أخرى غير الكربون .
٢	الذوبان	لا تذوب فى الماء غالبا وتذوب فى المذيبات العضوية	تذوب فى الماء
٣	درجة الغليان	منخفضة	مرتفعة
٤	درجة الانصهار	منخفضة	مرتفعة
٥	الروابط	تساهمية	أيونية
٦	سرعة التفاعلات	بطيئة	سريعة
٧	الرائحة	لها روائح مميزة	عديمة الرائحة غالبا
٨	الاشتعال	تشتعل وينتج ثانى اكسيد الكربون وبخار الماء	غير قابلة للاشتعال غالبا
٩	التوصيل الكهربى	لا توصل التيار الكهربى	توصل التيار الكهربى
١٠	البلورة	تتميز بقدرتها على البلورة	لا توجد غالبا
١١	المشابهة الجزيئية	توجد بين الكثير من المركبات	لا توجد غالبا

المونومر	البوليمر	الاسم التجارى	الخواص	الاستخدامات
$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ إيثيلين	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ -\text{C} - \text{C}- \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}_n$	بولى إيثيلين	لين ويتحمل المواد الكيميائية	أكياس البلاستيك الخرطوم الزجاجات البلاستيك
$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{C} = \text{C} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{H} \end{array}$ بروبين	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ -\text{C} - \text{C}- \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{H} \end{array}_n$ بولى بروبيلين	بولى بروبيلين P.P	قوى وصلب	السجاد والمفارش والمعلبات والشكاير البلاستيك
$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{C} = \text{C} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{Cl} \end{array}$ كلورو إيثين	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ -\text{C} - \text{C}- \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{Cl} \end{array}_n$ عديد كلورو إيثين	بولى فينيل كلوريد P.V.C	قوى وصلب أولين	مواسير الصرف الصحى و الرى وزجاجات الزيوت و جراكن الزيوت المعدنية و وخرطوم المياه و الأرضيات والأحذية أنايب بلاستيك وعوازل الأسلاك الكهربائية
$\begin{array}{c} \text{F} \quad \text{F} \\ \quad \\ \text{C} = \text{C} \\ \quad \\ \text{F} \quad \text{F} \end{array}$ رابع فلورو إيثين	$\begin{array}{c} \text{F} \quad \text{F} \\ \quad \\ -\text{C} - \text{C}- \\ \quad \\ \text{F} \quad \text{F} \end{array}_n$ عديد رابع فلورو إيثين	تفلون	يتحمل الحرارة ولا يلتصق عازل للكهرباء وخامل	تبطين أواني الطهى والخيوط الجراحية

الصيغة	اسم الحمض تبعاً لمصدره	الألكان	اسم الحمض تبعاً للأيونات
HCOOH	حمض الفورميك (النمل)	الميثان	ميثانويك
CH ₃ COOH	حمض الأسيتيك (الخل)	الإيثان	إيثانويك
C ₃ H ₇ COOH	حمض البوتيريك (الزبدة)	بيوتان	بيوتانويك
C ₁₅ H ₃₁ COOH	حمض البالمتيك زيت الأذيل	هكساديكان	هكساديكانويك

السؤال السابع: اذكر اهمية (استخدام كلا من) :-

المادة	الاهمية او الاستخدام
الرصاص في المركب الرصاصي	يستخدم كآنود يحدث له عملية الأكسدة أي عامل مختزل
الخاصين في العمود	يستخدم كآنود يحدث له عملية الأكسدة أي عامل مختزل
الأدلة الكيميائية	التعرف على نقطة انتهاء التفاعل ومعرفة نوع الوسط
محلول هيدروكسيد البوتاسيوم	الكتروليت يوصل التيار عن طريق حركة أيوناته في بطارية الوقود و الزئبق
حمض الكبريتيك في البطارية	الكتروليت يوصل التيار عن طريق حركة أيوناته في بطارية الرصاص الحامضية
التحليل الكهربى	يستخدم في الطلاء الكهربى وتنقية المعادن واستخلاص الألومنيوم
الطلاء الكهربى	حماية المعدن من التآكل واعطاؤه مظهر لامع جميل واعطاؤه قيمة أكبر
تنقية النحاس من الشوائب	الحصول على نحاس نقاؤه ٩٩.٩٥% يستخدم في التوصيل الكهربى
التحليل الكيميائى	معرفة تركيب التربة والصخور لتحديد صلاحيتها للزراعة معرفة محتويات المياه والأغذية من الملوثات الضارة معرفة كمية الغازات الضارة في الجو مثل SO ₂ و CO معرفة المكونات الفعالة في الدواء ومعرفة تركيز السكر في البول والدم معرفة تركيز العديد من مكونات المنتجات الصناعية
المعايرة في الكيمياء	تعيين تركيز محلول مجهول بواسطة محلول قياسي معلوم التركيز لمادة أخرى
القنطرة الملحية	تقوم بالتوصيل بين محلولى نصفى الخلية و تمنع الإتصال المباشر بين المحلولين . تقوم بمعادلة الشحنات الموجبة والسالبة التى تتكون فى محلولى نصف الخلية . تكون فرق جهد بين محلولى نصف الخلية .
قطب الهيدروجين القياسى	قياس جهود الأقطاب الأخرى المجهولة بمعلومية جهده الذى يساوى صفراً
خلية الزئبق	سماعات الأذن و الساعات و الآلات التصوير
ثنائى اكسيد الرصاص	يعمل كأكاثود فى بطارية السيارة
جهاز الهيدروميتر	جهاز كثافة السوائل و نعرف منه على حالة بطارية السيارة
الكريلوليت (Na ₃ AlF ₆)	اذابة البوكسيت
الفلسبار (CaF ₂)	مادة صهارة تخفض درجة انصهار المخلوط من ٢٠٤٥ الى ٩٥٠ درج
املاح فلوريدات الصوديوم و الألومنيوم و الكالسيوم	يعطى مع البوكسيت مصهور يتميز بانخفاض درجة انصهاره و كذلك كثافته منخفضة فيسهل فصل الألومنيوم

إكساب بعض الفلزات مظهراً لامعاً لحماية الفلز من التآكل ورفع قيمة بعض الفلزات و المعادن الرخيصة بعد طلائها بالكروم أو الذهب أو الفضة	طلاء المعادن
الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل كعامل مرطب للجلد وفي صناعة النسيج ليكسبه مرونة وفي مفرقات النيتروجليسرين	الجليسرول
مانع لتجمد الماء في مبردات السيارات ويستخدم في سوائل الفرامل الهيدروليكية (لأنه غير متطاير وشديد اللزوجة) وأحبار الطباعة والياق الداكرون ومادة أفلام التصوير	الإيثيلين جليكول
مذيب للزيوت والدهون وفي صناعة الادوية والطلاء والورنيش ويستخدم كوقود للسيارات وترموترات الحرارة المنخفضة	الإيثانول
تحضير الميثان في المعمل	أسياتات الصوديوم
تحضير حمض البكريك ومستحضرات السيلسيليك (كالأسبرين) والأصباغ والمطهرات	الفينول
يستخدم كوقود وفي الحصول على أسود الكربون والغاز المائي	الميثان
مبيد حشري	الجامكسان
خفض درجة انصهار الخليط في تحضير الميثان والبنزين	الجير الصودي
تبطين أواني الطهي وخيوط العمليات الجراحية	التفلون
صناعة الأدوات الكهربائية وطفائيات السجائر	الباكليت
صناعة مستحضرات التجميل وعلاج البرد والصداع وتحضير الأسبرين وزيت المروخ	حمض السيلسيليك
التنظيف الجاف	١،١،١ - ثلاثي كلورو ايثان
الرقائق والأكياس والزجاجات البلاستيك والخراطيم	البولي ايثيلين
السجاد والمفارش والشكاير والمعلبات	البولي بروبين P.P
مواسير الصرف الصحي والري والأحذية وخراطيم المياه وعوازل الأسلاك الكهربائية والأرضيات وزجاجات الزيوت وجراكن الزيوت	عديد كلوريد الفينيل P.V.C
في الأغذية المحفوظة كمادة حافظة لأنها تمنع نمو الفطريات على الأغذية	بنزوات الصوديوم
يمنع نمو البكتريا على الأغذية ويضاف للفاكهة المجمدة ليحافظ على لونها وطعمها	حمض السيتريك
مادة أولية في كثير من المركبات العضوية مثل الحرير الصناعي والصبغات والمبيدات الحشرية والإضافات الغذائية	حمض الأسيتيك
يستخدم كمخدر آمن	الهالوثان
مادة متفجرة ومادة مطهرة لعلاج الحروق	حمض البكريك
وقود أو مادة مختزلة	الغاز المائي
صناعة إطارات السيارات والحبر الأسود والبويات وورنيش الأحذية	أسود الكربون
صناعة متفجرات T.N.T وتحضير حمض البنزويك	الطولوين
مادة بادئة للتفاعل في البلمرة بالإضافة	فوق الأكاسيد

الفورمالدهيد	التكاثف مع الفينول لتكوين الباكليت
الأحماض الأمينية	تتبلر لتكوين البروتينات الطبيعية
الفريونات	أجهزة التكييف والثلاجات ومادة دافعة للسوائل والروائح ومنظفات للأجهزة الإلكترونية
مركبات عديد كلورو ثنائي فينيل PCB	مواد عازلة للحريق ومواد لاصقة وفي الدهانات والبلاستيك والأحبار والمبيدات الحشرية

الاستخدامات الهامة جدا

المادة	الرمز	الاستخدام
الأسكانديوم	^{21}Sc	يضاف مع الألومنيوم لصناعة طائرات الميج المقاتلة . تضاف الي مصابيح أبخرة الزئبق التي في التصوير التلفزيوني
اليتانيوم	^{22}Ti	يضاف مع الألومنيوم في صناعة الطائرات والمركبات الفضائية . يستخدم في زرع الاسنان والمفاصل الصناعية .
ثاني اكسيد التيتانيوم	TiO_2	يستخدم في تركيب مستحضرات الحماية من أشعة الشمس
الفانديوم	^{23}V	يضاف الي الصلب في صناعة زبركات السيارات
خامس اكسيد الفانديوم	V_2O_5	كصبغ في صناعة السيراميك والزجاج . كعامل حفاز في صناعة المغناطيسات فائقة التوصيل . عامل حفاز في تحضير حمض البنزويك
الكروم	^{24}Cr	يستخدم في طلاء المعادن ودباغة الجلود .
اكسيد الكروم III	Cr_2O_3	يستخدم في عمل الصمغ .
ثاني كرومات البوتاسيوم	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	تستخدم كمادة مؤكسدة
المنجنيز	^{25}Mn	تستخدم الحديد مع المنجنيز في صناعة خطوط السكك الحديدية تستخدم الألومنيوم مع المنجنيز في صناعة المشروبات الغازية
ثاني اكسيد المنجنيز	MnO_2	عامل مؤكسد قوي وصناعة العمود الجاف (حجر البطارية)
برمنجانات البوتاسيوم	K_2MnO_4	تستخدم كمادة مطهرة ومؤكسدة
كبريتات المنجنيز II	MnSO_4	تستخدم كمبيدات للفطريات
الحديد	^{26}Fe	يستخدم في الخرسانات المسلحة وأبراج الكهرباء . يستخدم في صناعة السكاكين ومواسير البنادق والأدوات الجراحية . يستخدم كعامل حفاز في تحضير النشادر بطريقة (هابر-بوش) يستخدم الحديد كعامل حفاز في تحويل الغاز المائي (CO + H_2) الي وقود سائل واطلق عليها طريقة (فيشر-تروبش)

اعداد : الدكتور محمد رزق

يستخدم في صناعة المغناطيس . يستخدم في البطاريات الجافة في السيارات الحديثة . له 12 نظير مشع وأهم نظائره الكوبلت 60 الذي تصدر عنه أشعة جاما التي تتميز بقدرة عالية علي النفاذ ولذلك يستخدم في : يستخدم في الطب (الكشف عن الاورام الخبيثة وعلاجها وحفظ المواد الغذائية و الكشف عن مواقع الشقوق ولحام الوصلات	^{27}Co	الكوبلت
يستخدم النيكل المجلز في هدرجة الزيوت . تستخدم سبائك النيكل مع الكروم في صناعة ملفات التسخين والافران الكهربائية يستخدم في صناعة بطاريات النيكل - كادميوم القابلة لإعادة الشحن	^{28}Ni	النيكل
يستخدم في صناعة الكابلات الكهربائية . صناعة سبائك العملات المعدنية . يتحد النحاس مع القصدير ويكون سبيكة البرونز .	^{29}Cu	النحاس
كمبيد حشري وكمبيد للفطريات في تنقية مياه الشرب تكوين محلول فهلنج .	CuSO_4	كبريتات النحاس II
يستخدم في جلفنة الفلزات .	^{30}Zn	الزئبق
يدخل في صناعة الدهانات والمطاط ومستحضرات التجميل	ZnO	أكسيد الزئبق
تستخدم في صناعة الدهانات المضيئة وشاشات الأشعة السينية	ZnS	كبريتيد الزئبق

الصيغ الكيميائية لبعض المركبات


الصيغة	المركب	الصيغة	المركب
^{38}Sr	الاسترانشيوم	Fe_3O_4	المجنتيت
^{56}Ba	الباريوم	Fe_2O_3	الهيماتيت
^{88}Ra	الراديوم	$2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	الليمونيت
^{39}Y	اليتريوم	FeCO_3	السيدريت
^{48}Cd	الكاديوم	FeO	أكسيد حديد ثنائي
^{57}La	اللانثانيوم	$(\text{COO})_2\text{Fe}$	او كسالات الحديد II
^{80}Hg	الزئبق	Cr_2O_3	أكسيد الكروم III

TiO ₂	ثاني أكسيد التيتانيوم	K ₂ Cr ₂ O ₇	ثاني كرومات البوتاسيوم
V ₂ O ₅	خامس أكسيد الفانديوم	MnO ₂	ثاني أكسيد المنجنيز
CO + H ₂	الغاز المائي	K ₂ MnO ₄	برمنجانات البوتاسيوم
CuSO ₄	كبريتات النحاس II	MnSO ₄	كبريتات المنجنيز II
ZnS	كبريتيد الزنك	ZnO	أكسيد الزنك
Ni ₃ Al	سبيكة (الالومنيوم والنيكل) الديور ألومين	Au ₂ Pb	سبيكة (الرصاص والذهب)

استخلاص الحديد:

التحميص:

[١] رفع نسبة الخام:




[٢] أكسدة الشوائب:



الاختزال:

[١] في الفرن العالي: (دور فحم الكوك)



[٢] في فرن مدرّكس: (دور الغاز المائي)



تفاعلات الحديد:



مع الأكسجين



مع بخار الماء



مع الكبريت



مع الكلور

مع الأحماض المخففة يعطى الحديد أملاح حديد (II) لأن الهيدروجين الناتج عامل مختزل




مع حمض الكبريتيك المركز الساخن:



أثر الحرارة على كل من:

(١) الحجر الجيري:



(٢) كربونات الحديد (II):



(٣) اوكسالات الحديد:




(٤) هيدروكسيد حديد (III):



(٥) كبريتات حديد (II):





(٦) الليمونيت:



www.facebook.com/D.M.RAZK

د/ محمد رزق 2016














٠١٠٠٨٨٤٦٦٣١



المقارنة	التحضير	الخواص
أكسيد الحديد II FeO	١- تسخين أكسالات الحديد: $\text{COO} \begin{array}{c} \\ \text{COO} \end{array} \xrightarrow{\Delta} \text{FeO} + \text{CO} + \text{CO}_2$ ٢- اختزال الأكاسيد الأعلى بالهيدروجين $400/700^\circ\text{C}$ $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{H}_2 \longrightarrow 2\text{FeO} + \text{H}_2\text{O}$ ٣- اختزال $400/700^\circ\text{C}$ $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{H}_2 \longrightarrow 3\text{FeO} + \text{H}_2\text{O}$	١- مسحوق أسود لا يذوب في الماء ولا يجذب إلى المغناطيس. ٢- يتأكسد بسهولة في الهواء. ٣- يتفاعل مع الأحماض المخففة ويعطى أملاح حديد II والماء $4\text{FeO} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$ $\text{FeO} + \text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\text{dil}} \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ اعداد : الدكتور محمد رزق
أكسيد الحديد III Fe_2O_3	١- من كلوريد حديد III $\text{FeCl}_3 + 3\text{NH}_4\text{OH} \longrightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{NH}_4\text{Cl}$ ٢- تسخين كبريتات حديد II 200°C $2\text{Fe}(\text{OH})_3 \xrightarrow{200^\circ\text{C}} \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ ٣- تسخين كبريتات حديد II $2\text{FeSO}_4 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2 + \text{SO}_3$	١- مسحوق أحمر لا يذوب في الماء ولا يجذب للمغناطيس. ٢- مع الأحماض المركزة الساخنة يعطى أملاح حديد III والماء $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\text{مركز/ساخن}} \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ اعداد : الدكتور محمد رزق
أكسيد حديد مغناطيسي Fe_3O_4	١- تسخين الحديد في الهواء لدرجة الاحمرار. $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$ ٢- امرار بخار الماء على حديد مسخن لدرجة الاحمرار. $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{500^\circ\text{C}} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$ ٣- بإختزال أكسيد حديد III $230/300^\circ\text{C}$ $3\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CO} \xrightarrow{230/300^\circ\text{C}} 2\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{CO}_2$	١- مسحوق أسود لا يذوب في الماء ومغناطيس قوى. ٢- يتفاعل مع الأحماض المركزة الساخنة ويعطى أملاح حديد II وأملاح حديد III والماء مما يدل على أنه أكسيد مركب. $\text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\text{conc./hot}} \text{FeSO}_4 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 4\text{H}_2\text{O}$ ٣- يتأكسد عند تسخينه في الهواء إلى أكسيد حديد III $2\text{Fe}_3\text{O}_4 + 1/2 \text{O}_2 \longrightarrow 3\text{Fe}_2\text{O}_3$

السؤال الثامن : اكتب الصيغ البنائية لكل من + التسمية + الأهمية

[٣] الإيثيلين جليكول $\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \\ \quad \\ \text{OH} \quad \text{OH} \end{array}$ مبردات السيارات لمنع تجمد المياه في المناطق الباردة - سوائل الفرامل الهيدروليكية - أحبار الأقلام الجافة - أحبار الطباعة	[٢] السوربيتول $\begin{array}{c} \text{CH}_2(\text{CHOH})_2\text{CH}_2 \\ \quad \\ \text{OH} \quad \text{OH} \end{array}$	[١] الجليسرول $\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 \\ \quad \quad \\ \text{OH} \quad \text{OH} \quad \text{OH} \end{array}$ يستخدم كمطبات للجلد - صناعة النسيج - تحضير النيتروجليسرين
[٦] الكاتيكول $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \\ \text{OH} \end{array}$	[٥] الفركتوز $\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{OH} \\ \\ \text{C} = \text{O} \\ \\ (\text{CHOH})_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ كيتون عديد الهيدروكسيل	[٤] الجلوكوز $\begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ (\text{CHOH})_4 \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ الدهيد عديد الهيدروكسيل
[٩] حمض سلسليك $\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \\ \text{OH} \end{array}$ صناعة مستحضرات التجميل الخاصة بالجلد لإعطائه النعومة وحماية من الشمس - تحضير الأسبرين وزيت المروخ وعلاج الصداع	[٨] حمض البكريك $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3 \end{array}$ ٦، ٤، ٢ ثلاثي نيترو فينول مادة متفجرة مادة مطهرة لعلاج الحروق	[٧] البيروجالول $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})_3 \end{array}$
[١٢] حمض اللاكتيك $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOH} \end{array}$ يوجد في اللبن نتيجة فعل الإنزيمات التي تفرزها بعض البكتيريا على سكر اللبن (اللاكتوز). يتولد في الجسم نتيجة للمجهود الشاق ويسبب تقلص العضلات	[١١] حمض الجلايسين $\begin{array}{c} \text{H} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$ (حمض أمينو أستيك) الموجودة في البروتينات الطبيعية من النوع ألفا أمينو	[١٠] ٤، ٢ ثنائي فينيل بنتان $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5) - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5) - \text{CH}_3$
[١٥] ٣، ٢ ثنائي ميثيل بيوتان $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	[١٤] ٢ برومو ٣ ميثيل بيوتان $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{Br} \end{array}$	[١٣] ٢ - فينيل بروبان $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$
[١٨] T.N.T $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{O}_2\text{N} - \text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3 \end{array}$ ٦، ٤، ٢ ثلاثي نيترو تولوين صناعة المتفجرات ومادة متفجرة	[١٧] ١ - برومو ٤ - كلورو ٣ - نيترو بنزين $\begin{array}{c} \text{Br} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)(\text{Cl}) \end{array}$	[١٦] ٣، ٣ ثنائي كلورو بنتان $\begin{array}{c} \text{Cl} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{Cl} \end{array}$


[٢١] ٤ كلورو ٢ بنتاين $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH} - \text{CH}_3$ Cl	[٢٠] ١ - كلورو ٢ بيوتين Cl $\text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$	[١٩] ٣ ميثيل ١ بيوتين CH_3 $\text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$
[٢٤] الهالوثون ٢ برومو ٢ كلورو ١، ١، ١ ثلاثي فلورو إيثان Br F H - C - C - F Cl F مخدر امن	[٢٣] الجامكسان سداسي كلورو بنزين مبيد حشري 	[٢٢] حمض الستريك يمنع نمو البكتريا على الأغذية ويضاف إلى الفاكهة المجمدة ليحافظ على لونها وطعمها 
[٢٧] ثنائي الفينيل $\text{C}_{12}\text{H}_{10}$ 	[٢٦] بنزوات الصوديوم COONa مادة حافظة لأنها تمنع نمو الفطريات على هذه الأغذية 	[٢٥] نفتالين C_{10}H_8 
[٣٠] الأسبرين أسيتيل حمض السلسليك تخفيف الآلام الصداع وخفض درجة الحرارة يقلل من تجلط الدم فيمنع حدوث الأزمات القلبية 	[٢٩] زيت المروخ سلسيلات ميثيل يستخدم كدهان موضعي لتخفيف الآلام الروماتيزمية 	[٢٨] النيترو جليسرين يستخدم في المفرقات توسيع شرايين القلب 
[٣٣] حمض الفثاليك 	[٣٢] حمض تيرفثاليك 	[٣١] حمض أكساليك حمض عضوي ثنائي القاعدية عدد ذرات الكربون يساوي عدد مجموعات الكربوكسيل 
[٣٦] حمض إيثانويك الخليك $\text{CH}_3 \text{C} \text{OOH}$ صناعة الحرير الصناعي - الصبغات - المبيدات الحشرية	[٣٥] حمض الفورميك $\text{H C} \text{OOH}$ حمض عضوي أحادي القاعدية عدد ذرات الكربون فيه يساوي عدد مجموعات الكربوكسيل صناعة الصبغات والمبيدات الحشرية - العطور - العقاقير - البلاستيك	[٣٤] ميثانال "فورمالدهيد" 
[٣٩] حمض البيوتيريك 	[٣٨] كبريتات إيثيل هيدروجينية 	[٣٧] استر ثلاثي الجليسريد صناعة الصابون والجلسرول 

السؤال التاسع : ماهي أضرار المواد التالية


الفريونات	تسبب تآكل طبقة الأوزون التي تقي الأرض من أخطار الأشعة فوق بنفسجية	الإيثانول	يسبب تليف الكبد وسرطان المعدة والمرئ
الكلوروفورم	الجرعات الزائدة تسبب الوفاة	البنزوبيريون	في السجائر ويسبب السرطان
د.د.ت	بقاؤه في القربة دون تحلل أدى إلى قتل الحشرات النافعة مثل النحل وتسربه إلى مياه الأنهار أدى إلى قتل الكائنات البحرية مثل الأسماك	PCB	تؤدي إلى تورم المفاصل واختلال وظائف الكبد وآلام العيون والسمع وتشوه المواليد
مركب D.D.T	أقبح مركب حضر في الكيمياء	مركبات عديد كلورو ثنائي فينيل	
حمض السلسيليك	يسبب فرحة المعدة	الميثانول	يسبب الجنون والعمى

السؤال العاشر : كيف تحصل علي (المعادلات توضيحية اكتب المعادلات كامله من المخطط)

[١] كحول ثنائي الهيدروكسيل من كحول أحادي الهيدروكسيل:



[٢] حمض الأسيتيك من كربيد الكالسيوم:




[٣] ١ ، ٢ ثنائي برومو إيثان من الإيثانول:




[٤] ١ ، ١ ثنائي برومو إيثان من كربيد الكالسيوم:




[٥] الميثان من كربيد الكالسيوم:




[٦] T.N.T من الفينول:




[٧] مبيد حشري من الأسيتيلين:




[٨] الهكسان الحلقى من الهكسان العادي




[٩] ميتا كلورو نيترو بنزين من الفينول:



[١٠] أرثو وبارا كلورو طولوين من البنزين:



[١١] بنزين حمض السلفونيك من الهكسان العادي:




[١٢] الكلوروفورم من الميثان:




[١٣] الإيثان من الإيثانول:



[١٤] نيترو بنزين من بنزوات الصوديوم:




[١٥] حمض الأسيتيك من منتجات بترولية:



[١٦] الأثير ثنائي الإيثيل من الإيثين (الإيثيلين):



[١٧] حمض البكريك من البنزين:



[١٨] الميثان من حمض الأسيتيك:



[١٩] استر أسيتات الإيثيل من الإيثان (الأسيتيلين):




[٢٠] الأثير ثنائي الإيثيل من يوديد الإيثيل:




[٢١] الأسيتاميد من الإيثين:




[٢٢] البنزين من الطولوين:




[٢٣] الطولوين من بنزوات الصوديوم:





[٢٤] الأثير ثنائي الإيثيل من حمض الأسيتيك:



[٢٥] استر بنزوات الإيثيل من الطولوين:



[٢٦] بنزاميد من حمض البنزويك:



السؤال الحادي عشر وضع بالمعادلات تأثير الصودا الكاوية على كل من


[١] يوديد الإيثيل:



[٢] أسيتات الإيثيل: (التحلل المائي بالتسخين مع قلوى مائي)




[٣] بنزوات الإيثيل:




[٤] حمض الإيثانويك:




[٥] كلورو بنزين:



[٦] حمض الكربوليك:



السؤال الثاني عشر وضع بالمعادلات تفاعل الماء مع كل من



[١] الميثان:




[٢] الإيثين:


[٣] كربيد الكالسيوم:




[٤] الإيثانين:




[٥] ٢ - ميثيل - ٢ - بيوتين



[٨] أسيتات الإيثيل: (التحلل المائي في وسط حمض)




[٩] مع الإسبرين:



السؤال الثالث عشر وضع بالمعادلات تفاعل النشادر مع كل من

[١] أستر أسيتات الإيثيل:



[٢] أستر بنزوات الإيثيل:




[٣] حمض الأسيتيك:




السؤال الرابع عشر وضع بالمعادلات تفاعل حمض الكبريتيك مع كل من


[١] البنزين:



[٢] الإيثانول عند درجة ١٨٠ °م:



[٣] الإيثانول عند ١٤٠ °م:



[٤] الإيثانول عند ٨٠ °م:



السؤال الخامس عشر اسئلة تفكيرية تربط العضوية بالابواب الاخرى

[١] كيف تحصل علي الاسيتالدهيد من الميثان :



[2] كيف تحصل علي الميثان من كبريتات الصوديوم :



كيف تحصل علي مهم جدا حل بسرعة ٢٠١٦

- (١) هيدروكسيد حديد II من هيدروكسيد حديد III
- (٢) اكسيد الحديد (III) من أوكسالات الحديد (II).
- (٣) اسود الكربون من خلاص الصوديوم.
- (٤) كبريتيد الحديد II من أكسيد الحديد المغناطيسي.
- (٥) إيثيلين جليكول من الإيثانول.
- (٦) استر اسيتات الايثيل من الكحول الايثيلي.
- (٧) الطولوين من البنزين.
- (٨) الفينول من الاستلين

مسائل هامة حل بسرعة ٢٠١٦

١- احسب الزمن اللازم لترسيب ٥,٤ جرام من الفضة اذا مر تيار كهربائي شدته ٩,٦٥ أمبير في محلول نترات الفضة ($Ag = 108$) اذا كان معادلة التفاعل عند الكاثود :



- ١- احسب حجم الماء اللازم إضافته إلى ٢٠٠ مليلتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه ٠,٣ مول / لتر لتحويله إلى محلول تركيزه ٠,١ مول / لتر.
- ٢- سخنت عينة من كلوريد الكوبلت II المتهدرت $CoCl_2 \cdot xH_2O$ كتلتها ٩,٥٦ جم سخنت تسخيناً شديداً إلى أن ثبتت كتلتها عند ٥,٢٤ جم . احسب عدد جزيئات ماء التبخر في جزيء كلوريد الكوبلت المتهدرت .
($Co = 60$, $Cl = 35.5$, $H = 1$, $O = 16$).
- ٣- أمر تيار شدته ٧ أمبير في محلول نترات أحد الفلزات لفترة زمنية قدرها ٤ دقائق . فإذا كانت كتلة الكاثود قبل مرور التيار الكهربائي ١٢ جم و أصبحت بعد مرور التيار الكهربائي ١٣,٨٨ جم . احسب الكتلة المكافئة الجرامية لهذا العنصر .
- ٤- محلول لحمض الأسيتيك تركيزه ٠,٥ مولار درجة تأينه ٣ % . احسب قيمة pOH لهذا المحلول.
- ٥- احسب كتلة النحاس المترسبة على الكاثود عند مرور تيار كهربائي شدته ١٠ أمبير لمدة نصف ساعة خلال محلول كبريتات النحاس (II). $Cu=63.6$
- ٦- احسب تركيز ايون $[OH^-]$ في المحلول علماً بأن تركيز $[H^+]$ يساوي 3×10^{-7} مول/لتر.
- ٧- التفاعل التالي يحدث في خلية جلفانية :-



احسب emf علماً بأن جهد الاختزال القياسي للحديد والنيكل على الترتيب هما $V = -0.4$ و $V = -0.23$.

٨- احسب درجة ذوبان كبريتات Ag_2SO_4 الفضة في الماء إذا علمت أن حاصل الذوبان (K_{sp}) يساوي 1.4×10^{-4}